

**DOPORUČENÝ SORTIMENT
ZÁHONOVÝCH PEREN**

2020

Věnováno Miládce Opatrné

VEDOUCÍ PROJEKTU

Ondřej Fous

METODIKA HODNOCENÍ

Tatiana Kuřková

VLASTNOSTI ROSTLIN A STANOVIŠTĚ

Zuzana Čechovská

NÁZVOSLOVÍ

Jiří Uher

EDITACE TABULEK A STATISTIKA

Martina Kotlandová

KOMPLETACE NOMINACÍ

Hana Pivoňková

PŘEKLAD METODIKY DO NĚMČINY

Veronika Voigt

NOMINACE (N), HODNOCENÍ (H) A DOPLŇKOVÉ HODNOCENÍ (D)

Petr Hanzelka (N/H/D)

Ondřej Fous (N/H)

Jiří Uher (N/H)

Josef Holzbecher (N/H/D)

Jana Holzbecherová (N/H/D)

Eva Holzbecherová (N/H/D)

Adam Baroš (N/H)

Radovan Hájek (N/H)

Jakub Krulich (N/H)

Pavel Matiska (N/H)

Markéta Kindlová (N/H/D)

Jana Pyšková (N/H)

Jarmila Solilová (N/H/D)

Renata Pešičková (N/H/D)

Tatiana Kuřková (N/H)

Vladislav Vejtasa (N/H/D)

Ivana Vejtasová (N/H)

Zuzana Caspers (N/H/D)

Pavel Sekerka (N/H/D)

Martin Charvát (H)

Luděk Urban (H)

Kateřina Pospíšilová (H)

Tereza Antošová (H)

Tereza Kvítková (H)

Zdeněk Kiesenbauer (H/D)

Martin Hajman (H/D)

Martina Šášiková (H)

Zuzana Čechovská (H)

Jonas Reif (H)

Vážení kolegové,

„Trvalky používat znamená trvalky znát“. Touto větou otevírá v roce 1960 Markéta Müllerová svou, dnes již legendární kapitolu „Použití trvalek“ v knize Naše trvalky. Její slova jsou dnes nejenže platná, ale nabývají na síle a významu. Od samých počátků sortimentální práce, kdy Martin Fulín či František Málek začali pereny pěstovat coby samostatné skupiny rostlin a František Thomayer je začal sázet do nově vznikajících pražských sadů, dodržovali zahradníci jednu důležitou zásadu. Pěstovali nejlepší odrůdy ze všech. Sorty překonané ze sortimentů vyřazovali, a přišel-li někdo s novinkou, musel si být sakra jist, že za něco stojí. Jinak pohořel. Rozvoj použití peren a nástup kontejnerové kultury v druhé polovině 20. století přinesl potřebu sortimenty prověřovat prostřednictvím záhonových testů. Této nesmírně metodicky náročné a pracné činnosti se chopila Miládka Opatrná, která se svými kolegyněmi neúnavně a precizně pracovala na průhonických zkušebních políčkách, postupovala matečný materiál školkám a ověřovala v terénu pravost odrůd více než půl století.

Tato velice potřebná práce nám v praxi stále citelněji chybí v době, kdy se globální perenařství činností korporací drasticky změnilo. Šlechtitelé, šřítele a množitelé uplatňují marketingové nástroje, které na trh vrhají stovky neproověřených novinek ročně a klasické, léty prověřené sortimenty mizí pod tlakem síly značky. Dostali jsme se do situace, kdy se jeden člověk nedokáže v perenách ani při nejlepší vůli komplexně orientovat. Pojem novinka ztratil na lesku. Vznikl začarovaný kruh, kde nabídka určuje poptávku a autoři jsou nuceni ke kompromisům snižujícím kvalitu a udržitelnost jejich díla. Syndrom tzv. přetečení sortimentů, známý z historických epoch u několika málo rodů, se projevil naplno a počet taxonů v oběhu narostl jen u nás na trojnásobek. Na evropský trh vstupuje ročně několik tisíc novinek. Angličané se tomu intenzivně brání záhonovými testy a také německy mluvící země spojily síly a sortimenty kriticky prověřují.

Čeští perenaři, s německou a slovenskou evaluací, spojili síly coby profesní komunita a nabízí tímto kolektivním dílem široké zahradnické obci pomocnou ruku. Využili jsme metodiku hodnocení prostřednictvím společné zkušenosti a dali postupně dohromady 24 individuálních vysvědčení sortimentu záhonových peren. Zapojily se instituce, univerzity, školky i projektanti. Kolegium nejdříve nominovalo, posléze hodnotilo. Nominováno bylo 1121 taxonů, doporučených jsme vybrali 616. Jako výchozí jsme použili metodiku Miládky Opatrné ze 70. let a rozvinuli ji do podoby kritérií „OZT – ověřená zahradní trvalka“. Srovnatelné parametry používá pro ocenění AGM britská Royal Horticultural Society, německý Stauden Ring v záhonových testech, Euro-Trials nebo americké hodnocení peren v Chicago BG, Mt. Cuba Center a dalších institucích. Taková trvalka má růst a kvést při základní péči v záhonových podmínkách. Překvapivě málo moderních peren toto prosté kritérium splňuje a klasickým sortimentům se dostává zasloužené pozornosti.

Doporučený sortiment záhonových peren jsou prostá data s tabulkovým aparátem určená užší profesní obci projektantů, školkařů a zahradníků. Jim budou denní stravou a oporou v práci, neboť obsahují průsečík letitou zkušeností. Nikterak nepodvazují práci s dalšími, speciálními sortimenty peren. Naopak. Dávají křídla autorské práci s vytrvalými květinami a vytváří předpoklady pro vznik originálního díla. Díky dobrému základu máte prostor zkoušet a experimentovat. Kriticky hodnotit svoje zkušenosti s kolegy. Ať dobře slouží všem.

Ondřej Fous, 1. února 2020

CO JE ZÁHON A CO JSOU ZÁHONOVÉ PERENY? (Tatiana Kutková, Ondřej Fous)

Pereny určené do záhonových podmínek jsou především vytrvalé přezimující byliny odpovídající svými nároky tomuto konkrétnímu stanovišti. Převážně se jedná o taxony, které prošly dlouholetým intenzivním šlechtěním, a v jiných než záhonových podmínkách dlouhodobě neprosperují. Do hodnocení jsou zahrnuty ale i takové druhy, které mají rozsáhlou ekologickou amplitudu a prosperují jak v záhonech, tak v jiných stanovištních podmínkách ve společenstvech dalších rostlin, jako například v podrostech a okrajích porostů či na různých typech otevřených ploch (ve smyslu pojetí stanovištních okruhů *Hansen/Stahl/Sieber*). Nenajdete tak zde vysloveně vlhkomilné druhy, alpinky nebo stepní či préríjní květeny, ale pouze takové, které snáší i záhon v běžných podmínkách. Předmětem hodnocení nejsou trávy a kapradiny, budou zpracovány samostatně.

Záhon zde chápeme především jako kulturní konstrukt, jako prostředí i jako svébytný žánr. Hlavním rysem záhonu je práce, tedy soustavná zahradnická péče. Jeho podmínky jsou odvislé od čerstvé zahradní půdy s relativně vyšším podílem organické složky, živin, propustností danou pravidelným obděláváním, nakypřováním, živým edafonem a zálivkou. Pereny pro použití na záhonech se k tomuto hodí svým obecným charakterem, kulturní tradicí i estetickými a pěstitelskými vlastnostmi. Světelnou expozicí může záhon v tomto pojetí odpovídat plně osluněným volným plochám mezofilního charakteru, polostínu či bloudivému stínu okrajů porostů či plnému stínu podrostů a budov (tedy nikoliv dle pojetí stanovištních okruhů *Hansen/Stahl/Sieber*). Prostorově pereny plní úlohu soliter, středního patra i pokryvu či nízkých obrub.

Určujícím pro užití taxonu v záhonu je klasický perenářský požadavek, kdy rostlina „roste a kvete v běžných podmínkách“. V záhonech ovšem často bývají využívány i rostliny vyžadující specifickou dotaci pěstebních zásahů (lokální úprava substrátu, individuální zálivka či hnojení, pravidelné postřiky proti listovým chorobám, speciální opory apod.), což výrazně ovlivňuje jejich životnost. Tyto rostliny jsou v rozporu s níže uvedenými parametry OZT a kolektivní hodnocení je pro tyto pracovní nároky vyřadilo. Jejich použití autorem kompozice z estetických či jiných důvodů tak vytváří nutnost zpracování individuálního plánu péče pro konkrétní záhonové řešení.

METODIKA HODNOCENÍ *(dle Milady Opatrné; Tatiana Kutková, Ondřej Fous)*

Kolektivní hodnocení expertní skupiny je účinnou alternativou ke klasickým záhonovým testům, která zhodnocuje profesní pohled pracovníků institucí a škol, projektantů a školkařů. Jako hodnotitelé byly proporčně zastoupeny všechny tři skupiny. Dále přináší průnik osobních zkušeností z celé škály různých stanovišť a extrémních situací, s kterými se jednotlivci ve své často letité praxi setkali v našich i přespolních podmínkách. Celkem 29 hodnotitelů vypracovalo 24 hodnocení dle níže uvedených kritérií a poskytli rozsáhlý soubor dat k dalšímu zpracování.

OVĚŘENÁ ZAHRADNÍ TRVALKA (OZT)

| hodnocení | bodů |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| A - velmi dobré; trvalka splňuje všechny hodnotící parametry | 4 |
| B - dobré; trvalka splňuje minimálně 5 hodnotících parametrů | 3 |
| C - vyhovující; trvalka splňuje minimálně 3 hodnotící parametry | 2 |
| D - sbírkové; trvalka splňuje méně než 3 hodnotící parametry | 1 |
| AA- preferovaný osobní favorit hodnotitele | 8 |

parametry OZT

- 1 trvalka vhodná pro prostředí záhonu (včetně polostínu, stínu)
- 2 na stanovišti vytrvá nejméně tři sezóny bez nutnosti přemnožení
- 3 na adekvátním stanovišti dobře prosperuje při standardní péči
- 4 nenamrzá
- 5 nevyžaduje speciální péči (vyvazování, příkryvka, zaštipování, ochrana před vyhníváním atd.)
- 6 není agresivní ke svému okolí (nerozrůstá se intenzivně oddenky či nešíří se semeny)
- 7 netrpí chorobami a škůdci

POSTUP HODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ (Ondřej Fous, Tatiana Kuřková, Martina Kotlandová)

První tabulka nabídla strukturu pro 250 základních peren, dále dvacet nejpočetnějších rodů s očekávanými kvótami zastoupení a samostatný list pro sbírkové trvalky vynikajících vlastností, které by zasloužily větší rozšíření. Do nich postupně v období prosinec 2011 až únor 2014 jeden po druhém vepisovalo své favority osmnáct nominujících kolegů.

Touto cestou se sešlo 1235 záznamů. Díky neustálenému užívání vědeckých jmen taxonů zůstalo po odstranění zjevných duplicit 1121 taxonů. V září 2015 tak mohl být, po patřičné editaci a sjednocení celé tabulky, postoupen soubor všem hodnotitelům. Každý z nich za využití parametrů OZT následně hodnotil pouze druhy, s kterými byl v praxi natolik obeznámen, aby dokázal kritéria posoudit. Míra sebekritičnosti byla značná. Část hodnotitelů se věnovala pouze specifickým rodům, více než polovina ale hodnotila řádově stovky taxonů, tj. významnou část tabulky. Školkaři se konfrontovali s nízkou znalostí peren v použití, projektanti naopak se šíří sortimentů. Poslední nám své hodnocení 15. května 2017 poskytl německý perenař Jonas Reif, jehož Foerster Stauden Kompendium patří mezi to nejlepší v současném evropském perenařství. O kvalitě nominovaných i nominujících svědčí i výsledný bodový průměr 3,48 všech taxonů. Nominováno bylo tedy skutečně to nejlepší ze sortimentu. Přesto se 28 položek nedočkalo žádného hodnocení, tedy ani od svého vlastního nominanta. Významným sítím byla četnost hodnocení, která ukázala naplno problematiku přetečení sortimentů, jelikož jednoho nebo dva hodnotitele mělo 233 položek.

Následujících sedm vyřazovacích kol proběhlo postupnými kroky v zájmu zachování konzistence celé práce. Prostým převedením na řeč čísel by samozřejmě vypadly některé celé rody. Už v prvním kole vypadlo 175 položek čistě pro nízké hodnocení nebo nízký počet hodnotitelů. Klíčová rozhodnutí přišla až po třetím kole. Celkem 989 taxonů mělo hodnocení nad 3 body, a byly tak potenciálně řazeny mezi odrůdy třídy A nebo B. Pouze 284 taxonů mělo nad deset hodnotitelů a vykazovalo obecnou známost. Dokonce i při toleranci k počtu hodnocení nad 4 se nám nabízelo 754 taxonů.

Bylo nutno zohlednit expertní povahu posouzení některých rodů. Šlo zejména o rody *Iris*, *Paeonia* a *Hemerocallis*, které pro jejich obecnou četnost umí hodnotit pouze málo z nás. Druhým tématem pak bylo proporční zastoupení některých rodů, které by díky svým pěstitelským specifikům zcela vypadly. Šlo například o rody *Delphinium* nebo *Monarda*. Disproporčně vysokého hodnocení naopak dosahovaly rody *Aster*, *Astilbe*, *Geranium*, *Helenium*, *Salvia* a *Veronica*, které vítězily svou shodou u hodnotitelů díky známosti některých kultivarů.

Po třetím kole se těsně nad čarou ocitly některé velmi známé pereny nebo druhy, kterým hodnotitelé přisoudili kategorii AA. Rozhodli jsme se tedy na základě resumé z 12. března 2017 postupovat dále individuálně ve smyslu proporcionality zastoupení a hlavního účelu DS, totiž manuálu pro obecné použití peren. Čtvrté kolo bylo již skalpelem vyřezávajícím do jednotlivých rodů ratio mezi počtem hodnocení a výší hodnocení. Po něm jsme přistoupili k radikálnímu kroku a požádali nejaktivnější hodnotitele v únoru 2018 o doplňkové hodnocení 126 vybraných taxonů. To bylo velmi nápomocné a pomohlo nám vyřadit zdánlivě pouhých 34 dalších položek. Konečně se tak mohlo v pátém kole vše uzavřít a měli jsme připravenou tabulku pro revizi názvosloví. Při této práci a vytváření celého tabulkového elaborátu parametrů jednotlivých položek docházelo k objevování dalších vnitřních duplicit velmi podobných kultivarů. V průběhu vytváření tabulkové části od září 2018 do ledna 2020 jsme tak vymístili několik šikovně skrytých alpinek, krátkověkých, choulostivých a plevelících se rostlin. V šestém a sedmém kole tak DS zhubl o dalších 46 rostlin a dostali jsme se na cílových 616.

VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ (Ondřej Fous)

Skutečnost, že profesionální perenáři jsou opravdu fajnšmekři a dovedou ocenit i květenu mimo hledáček marketérů, dokazují absolutní vítězové hodnocení. Stala se jím *Heterotheca camphorum* var. *glandulissimum* s bodovým ziskem 5,5 a spolu s ní *Gillenia trifoliata* s 5,32. Třetí místo již obsadil *Phlox paniculata* 'Little Princess'. Samozřejmě se tak stalo díky možnosti hodnotitele vřadit maximálně patnáct taxonů do třídy AA. Hledáme-li ovšem absolutního vítěze podle součtu bodového zisku, není jím nikdo jiný než nejslavnější perena československého původu a tou je *Rudbeckia fulgida* var. *sullivantii* 'Goldsturm' se ziskem 107 bodů. Na druhém místě je krásně čistá botanika *Waldsteinia geoides* majíc 90 bodů a třetí skončila *Echinacea purpurea* 'Magnus' zaslouživši si 88 bodů. Tyto se také logicky dočkaly nejvyššího počtu hodnocení.

Kdo tedy skončil na chvostu? Když se podíváme do všech výsledků před vyřazovacími koly, uvidíme na samém chvostě důkaz, že kolektivní hodnocení funguje. Skončily zde rostliny jako *Alstromeria aurantiaca*, *Asclepias incarnata* nebo *Ficaria verna* 'E.A.Bowles', které potřebují svoje anebo v záhoně skýtají značná rizika. Zajímavý je též pohled na „květiny nad propastí“, které se ocitly kdesi pod čarou pro svou zásadní neshodu s parametry v jednom bodě a široká shoda je shodila. Mezi ně patří invazní *Telekia speciosa*, choulostivé *Polygonum microcephalum* 'Red Dragon' nebo krátkověká přesévající se *Verbena hastata*. Zajímavý byl osud aster 'Jenny' a Winston Churchill', které mívají problém s padlím. Prvá přežila jen díky vysokému počtu hodnocení. Ostatně sourozenecké boje nebyly výjimkou. *Monarda* 'Cambridge Scarlet' prohrála s 'Gardenview Scarlet' jen o fous. S odřenýma ušima prošly přesévající se *Centranthus ruber* a expanzivní *Lysimachia punctata*. Kvalitu evaluace také ukazuje vztah k novinkám. Přestože faktor dostupnosti sorty nahrával klasickým sortimentům, vedly si dobře i kvalitní novější sorty množené často in vitro. Suverénně samozřejmě *Geranium* 'Gerwat' Rozanne najdeme již na osmé pozici. Na pěkném sedmnáctém místě je *Rudbeckia subtomentosa* 'Henry Eilers' a *Salvia* 'Caradonna' na 42. pozici.

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| B 3,1 | <i>Acanthus</i> | <i>hungaricus</i> | | | | paznehtník | 30-40 | 60-80 | VII-VIII | bílá, narůžovělá, purpurové listeny | zelený | FR2 | 3-5 | |
| A 3,6 | <i>Achillea</i> | | | ‘Coronation Gold’ | | řebříček | 30 | 80 | V-VI | sytě žlutá | šedozeleň | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 3,9 | <i>Achillea</i> | | | ‘Moonshine’ | | řebříček | 20 | 40-60 | VI-VIII | světle žlutá | bílošedý, měkkce chlupatý | FR1,B1 | 5-7 | remontuje |
| B 3,1 | <i>Achillea</i> | | | ‘Paprika’ (Galaxy Series) | | řebříček | 25 | 60 | VI-VIII | oranžovočervená | zelený | B2,FR2 | 5-7 | remontuje |
| B 3,1 | <i>Achillea</i> | | | ‘Summerwine’ | | řebříček | 25 | 70 | VII-IX | tmavě vínově červená | zelený | B2,FR2 | 5-7 | remontuje |
| B 3,1 | <i>Achillea</i> | | | ‘Terracotta’ | | řebříček | 25 | 60-80 | VI-VIII | oranžovohnědá až krémově žlutá | zelený | B2,FR2 | 5-7 | remontuje |
| A 3,9 | <i>Achillea</i> | <i>filipendulina</i> | | ‘Parker’s Variety’ | | řebříček | 40 | 80-100 | VII-IX | zlatožlutá | šedozeleň | B2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,0 | <i>Achillea</i> | <i>millefolium</i> | | ‘Cerise Queen’ | | řebříček | 25 | 60-70 | VI-VIII | třešňově červenorůžová, bílé středy | zelený | B2,FR2 | 5-7 | remontuje |
| B 3,4 | <i>Achillea</i> | <i>millefolium</i> | | ‘Lilac Beauty’ | | řebříček | 25 | 60 | VI-IX | světle lila růžová | zelený | B2,FR2 | 5-7 | remontuje |
| B 3,4 | <i>Achillea</i> | <i>ptarmica</i> | | ‘Nana Compacta’ | | řebříček | 20 | 20-30 | VII-IX | bílá | tmavě zelený | FR3,B- 2-3,WR3 | 9-12 | stálezelená |
| A 3,5 | <i>Achillea</i> | <i>ptarmica</i> | | ‘The Pearl’ (The Perle Group) | | řebříček | 50 | 40-60 | VII-IX | bílá/plný | tmavě zelený | FR3,B- 2-3,WR3 | 7-9 | stálezelená |
| B 3,0 | <i>Achillea</i> | <i>sibirica</i> | subsp. <i>camschatica</i> | ‘Love Parade’ | | řebříček | 50 | 60 | VI-VII | jemně růžová | zelený | FR2-3,B2-3 | 5-7 | |
| B 3,4 | <i>Aconitum</i> | <i>× cammarum</i> | | ‘Bicolor’ | | oměj | 60 | 100 | VII-VIII | fialovomodrá, bílá | tmavě zelený | B2,GR2 | 5-7 | |
| B 3,4 | <i>Aconitum</i> | <i>carmichaelii</i> | | Wilsonii Group | | oměj | 80 | 120-150 | VIII-IX | fialovomodrá | tmavě zelený | GR2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Aconitum</i> | <i>napellus</i> | | | | oměj | 60 | 110 | VII-VIII | modrofialová | tmavě zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | |
| A 4,0 | <i>Actaea</i> | <i>matsumurae</i> | | ‘White Pearl’ | <i>Cimicifuga matsumurae</i> ‘White Pearl’ | ploštičník | 90 | 130 | IX-X | bílá | zelený | GR2-3,G2-3 | 5-7 | |
| B 3,3 | <i>Actaea</i> | <i>pachypoda</i> | | | | samorostlík | 60 | 60-80 | V-VI | bílá | zelený | G2,GR2 | 5-7 | bílé plody |
| B 3,4 | <i>Actaea</i> | <i>rubra</i> | | | <i>Actaea erythrocarpa</i> | samorostlík | 40 | 40-60 | V-VI | bílá | zelený | G2,GR2 | 5-7 | červené plody |
| A 3,7 | <i>Actaea</i> | <i>simplex</i> | | ‘Brunette’ (Atropurpurea Group) | <i>Cimicifuga simplex</i> (Atropurpurea Group) ‘Brunette’ | ploštičník | 80 | 120-160 | IX-X | krémově bílá | vínovo- fialový | GR2-3,G2-3 | 5-7 | struktury |

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| A | 3,5 | <i>Actaea</i> | <i>simplex</i> | | Atropurpurea Group <i>Cimicifuga simplex</i> Atropurpurea Group | ploštičnik | 80 | 160-180 | IX-X | narůžověle bílá | hnědo- červený až zelený | GR2-3,G2-3 | 3-5 | struktury |
| B | 3,2 | <i>Agastache</i> | | | 'Blackadder' | agastache | 60 | 80-100 | VII-IX | tmavě modrofialová | zelený | B1 | 3-5 | struktury |
| B | 3,4 | <i>Agastache</i> | | | 'Blue Fortune' | agastache | 50 | 60-80 | VII-IX | světle modrofialová | zelený | B1 | 3-5 | |
| A | 4,0 | <i>Ageratina</i> | <i>altissima</i> | | 'Chocolate' <i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate' | sadec | 60 | 80-100 | IX-X | bílá | tmavě fialovo- hnědozelený | GR2-3, B2-3, FR2-3, WR4 | 3-5 | |
| A | 3,8 | <i>Alchemilla</i> | <i>erythropoda</i> | | | kontryhel | 15 | 20-30 | VI-VII | zelenožlutá | zelený, jem- ně chlupatý | ST2,M2,FS2 | 9-12 | |
| B | 3,4 | <i>Alchemilla</i> | <i>mollis</i> | | 'Thriller' | kontryhel | 30 | 30-40 | VI-VII | zelenožlutá | šedozeleý | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | |
| A | 4,7 | <i>Amsonia</i> | <i>tabernaemontana</i> | | | amsónie | 60 | 60-80 | V-VII | světle modrá | zelený/žlutý | FR2,GR2 | 5-7 | |
| A | 4,1 | <i>Anaphalis</i> | <i>margaritacea</i> | | 'Neuschnee' | plesnivka | 30 | 40-50 | VII-IX | bílá | zelenošedý chlupatý | FR2,ST2,FS2 | 9-12 | |
| A | 3,6 | <i>Anemone</i> | | | 'Honorine Jobert' | sasanka | 40 | 70-90 | VIII-X | bílá | zelený | GR2,FR2,B2 | 7-9 | |
| A | 3,5 | <i>Anemone</i> | | | 'September- charm' | sasanka | 30 | 60-80 | VIII-IX | světle lilarůžová | zelený | GR2,FR2,B2 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Anemone</i> | | | 'Whirlwind' | sasanka | 60 | 80-100 | VIII-IX | bílá/poloplný | zelený | GR2,FR2,B2 | 5-7 | |
| A | 3,7 | <i>Anemone</i> | | | 'Andrea Atkinson' | sasanka | 40 | 80-100 | IX-X | bílá | zelený | GR2,FR2,B2 | 5-7 | |
| B | 3,3 | <i>Anemone</i> | <i>hupehensis</i> | | 'Praecox' | sasanka | 40 | 60-80 | VIII-X | purpurovorůžová | zelený | GR2,FR2,B2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Anemone</i> | <i>hupehensis</i> | var. <i>japonica</i> | 'Bressingham Glow' | sasanka | 40 | 70-100 | VIII-X | růžovopurpurová, poloplný | zelený | GR2,FR2,B2 | 5-7 | |
| B | 3,2 | <i>Anemone</i> | <i>hupehensis</i> | var. <i>japonica</i> | 'Prinz Heinrich' | sasanka | 40 | 60-80 | IX-X | tmavě růžová/ poloplný | zelený | GR2,FR2,B2 | 7-9 | |
| B | 3,0 | <i>Anemone</i> | <i>multifida</i> | | 'Rubra' | sasanka | 10 | 20-30 | V-VI | sytě růžovo- červená, bílé oko | zelený | ST1-2,GR- 1-2,FR1-2 | 9-12 | |
| A | 3,6 | <i>Anemone</i> | <i>sylvestris</i> | | | sasanka | 15 | 20-30 | V-VI | bílá | zelený | GR1-2,FR- 1-2,SH1-2 | 9-12 | |
| A | 3,8 | <i>Anthemis</i> | <i>tinctoria</i> | | 'E.C. Buxton' | rmen | 20 | 40-70 | VI-IX | citronově žlutá, tmavě žlutý střed | šedozeleý | B1,FR1 | 7-9 | |
| B | 3,1 | <i>Artemisia</i> | <i>abrotanum</i> | | | pelyněk | 50 | 80-100 | VII-IX | žlutozeleý | šedozeleý | FR1,ST1,FS1 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
| A | 3,6 | <i>Artemisia</i> | <i>absinthium</i> | | 'Lambrook Silver' | pelyněk | 50 | 50-80 | VII-IX | krémově žlutá | stříbřitě šedobílý | FR1,ST1,FS1 | 3-5 | stálezelená | |
| B | 3,0 | <i>Artemisia</i> | <i>lactiflora</i> | | | pelyněk | 60 | 100-150 | IX-X | bílá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 2-3 | | |
| B | 3,2 | <i>Artemisia</i> | <i>ludoviciana</i> | | 'Valerie Finnis' | pelyněk | 50 | 60 | VII-VIII | žlutavě bílá | stříbřitě šedý | B1,FR1 | 5-7 | polostálezelená | |
| B | 3,2 | <i>Artemisia</i> | <i>ludoviciana</i> | | 'Silver Queen' | pelyněk | 50 | 70 | VII-VIII | žlutavě bílá | šedozelelý | B1,FR1 | 5-7 | polostálezelená | |
| B | 3,2 | <i>Artemisia</i> | <i>schmidtiana</i> | | 'Nana' | pelyněk | 20 | 20-25 | VI-VIII | bělavá | bělavě šedý | ST1-2,M-1-2,FS1-2 | 7-9 | stálezelená | |
| A | 3,9 | <i>Aruncus</i> | | | 'Horatio' | udatna | 50 | 80-120 | VI-VII | bílá | tmavě zelený, bronzová lodyha | FR2,GR2 | 2-3 | struktury | |
| A | 4,1 | <i>Aruncus</i> | <i>aethusifolius</i> | | | udatna | 20 | 30 | V-VII | krémově bílá | zelený /oranžovo-hnědočervený | ST2, GR2 | 9-12 | | |
| A | 4,0 | <i>Aruncus</i> | <i>dioicus</i> | | | udatna | 80 | 150-180 | VI-VIII | krémově bílá | zelený | G2,GR2 | 2-3 | struktury | |
| B | 3,5 | <i>Asparagus</i> | <i>officinalis</i> | | | chřest | 80 | 100-150 | VI | zelenobílá | zelený | GR1-2 | 2-3 | červené plody | |
| A | 3,7 | <i>Asphodeline</i> | <i>lutea</i> | | | kopíčko | 25 | 80-100 | V-VI | žlutá | modrozelelý | FR1,FS1,ST1 | 5-7 | stálezelená | |
| A | 4,1 | <i>Aster</i> | | | 'Little Carlow' | <i>Symphyotrichum cordifolium</i> 'Little Carlow' | hvězdnice | 70 | 80-110 | VIII-X | světle modrá | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Aster</i> | | | 'Pink Star (Universum Group)' | <i>Symphyotrichum</i> 'Pink Star' | hvězdnice | 70 | 100-120 | IX-XI | světle růžová | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| B | 3,3 | <i>Aster</i> | <i>ageratoides</i> | | 'Asran' | hvězdnice | 50 | 50-80 | IX-X | světle lila fialová | zelený | GR1-2,FR1-2 | 5-7 | | |
| A | 3,8 | <i>Aster</i> | <i>amellus</i> | | 'Brilliant' | <i>Aster amellus</i> 'Brilliant' | hvězdnice | 30 | 40-60 | VIII-IX | fialovorůžová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Aster</i> | <i>amellus</i> | | 'Rosa Erfüllung' | <i>Aster amellus</i> 'Pink Zenith' | hvězdnice | 30 | 40-60 | VIII-IX | růžová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Aster</i> | <i>amellus</i> | | 'Rudolf Goethe' | hvězdnice | 40 | 50 | VIII-IX | lila fialová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | | |
| A | 3,9 | <i>Aster</i> | <i>amellus</i> | | 'Veilchenkönigin' | hvězdnice | 30 | 50-60 | VIII-X | tmavě fialová, žlutý střed | tmavě zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | | |
| A | 3,7 | <i>Aster</i> | <i>divaricatus</i> | | | <i>Eurybia divaricata</i> | hvězdnice | 40 | 40-60 | VIII-IX | bílá | zelený | GR2,G2,FR1-2 | 5-7 | |
| B | 3,4 | <i>Aster</i> | <i>ericoides</i> | | 'Esther' | <i>Symphyotrichum ericoides</i> 'Esther' | hvězdnice | 60 | 80-100 | IX-XI | světle lila růžová | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|--------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| A | 4,0 | <i>Aster</i> | <i>ericoides</i> | | 'Finale' | <i>Symphotrichum ericoides</i> 'Finale' | hvězdnice | 70 | 100-120 | IX-XI | růžově lila | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A | 3,8 | <i>Aster</i> | <i>ericoides</i> | | 'Schneetanne' | <i>Symphotrichum ericoides</i> 'Schneetanne' | hvězdnice | 70 | 100-120 | IX-XI | bílá | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Aster</i> | <i>ericoides</i> | f. <i>prostratus</i> | 'Snowflurry' | <i>Symphotrichum ericoides</i> f. <i>prostratum</i> 'Snowflurry', <i>Aster pansus</i> 'Snowflurry' | hvězdnice | 10 | 10-20 | IX-X | bílá | zelený | ST2,MK2, FS2,GR2 | 5-7 | |
| A | 4,0 | <i>Aster</i> | <i>x frikartii</i> | | 'Mönch' | | hvězdnice | 50 | 70 | VIII-IX | světle modrá | tmavě zelený | B1-2,FR1-2 | 5-7 | |
| B | 3,3 | <i>Aster</i> | <i>laevis</i> | | 'Calliope' | <i>Symphotrichum laevis</i> 'Calliope' | hvězdnice | 90 | 90-100 | IX-X | světle fialově modrá | tmavě zelený | FR1-2,GR1-2 | 3-5 | padlí |
| A | 3,7 | <i>Aster</i> | <i>lateriflorus</i> | | 'Lady in Black' | <i>Symphotrichum lateriflorum</i> 'Lady in Black' | hvězdnice | 80 | 80-150 | IX-X | bílá, purpurovo-růžový střed | vínově hnědý, raší černo-červeně | FR2,B2 | 3-5 | struktury |
| A | 3,6 | <i>Aster</i> | <i>lateriflorus</i> | | 'Lovely' | <i>Symphotrichum lateriflorum</i> 'Lovely', <i>Aster vimineus</i> 'Lovely' | hvězdnice | 60 | 50-70 | VIII-X | světle růžově lila | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A | 3,6 | <i>Aster</i> | <i>lateriflorus</i> | var. <i>horizontalis</i> | | <i>Symphotrichum lateriflorum</i> var. <i>horizontalis</i> , <i>Aster lateriflorus</i> 'Horizontalis' | hvězdnice | 50 | 60-70 | IX-X | bílá, purpurovo-růžový střed | zelený, raší vínově zeleně | FR2,B2 | 5-7 | |
| A | 3,6 | <i>Aster</i> | <i>linosyris</i> | | | <i>Galatella linosyris</i> | hvězdnice | 30 | 40-60 | VII-XI | žlutá | zelený | FR1,SH1 | 9-12 | |
| A | 3,9 | <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | | 'Andenken an Alma Pötschke' | <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Andenken an Alma Pötschke' | hvězdnice | 60 | 80-100 | IX-X | svítivě růžovočervená | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 5-7 | |
| B | 3,4 | <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | | 'Barr's Blue' | <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Barr's Blue' | hvězdnice | 100 | 100-150 | IX-X | modrofialová | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 2-3 | |
| B | 3,4 | <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | | 'Barr's Pink' | <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Barr's Pink' | hvězdnice | 100 | 100-150 | IX-X | fialovorůžová /poloplný | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 2-3 | |
| A | 3,7 | <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | | 'Herbstschnee' | <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Herbstschnee' | hvězdnice | 80 | 100-120 | IX-X | bílá | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 2-3 | |
| A | 3,9 | <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | | 'Purple Dome' | <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Purple Dome' | hvězdnice | 50 | 50-60 | IX-X | sytě purpurová /poloplný | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|---------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| A | 4,3 | Aster | <i>novae-an- gliae</i> | | 'Rubinschatz' <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Rubinschatz' | hvězdnice | 80 | 100-120 | VIII-X | purpurovočervená | zelený, drsně chlupatý | B2, FR2 | 2-3 | |
| A | 3,8 | Aster | <i>novae-an- gliae</i> | | 'Violetta' <i>Symphotrichum novae-angliae</i> 'Violetta' | hvězdnice | 90 | 130-140 | IX-X | tmavě fialová | zelený, drsně chlupatý | B2,FR2 | 2-3 | |
| B | 3,2 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Anneke' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Anneke' | hvězdnice | 25 | 25-35 | IX-X | růžová | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| A | 4,0 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Blaue Lagune' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Blue Lagoon' | hvězdnice | 20 | 50 | IX-X | sytě fialovomodrá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| B | 3,3 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Fellowship' <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Fellowship' | hvězdnice | 70 | 90-100 | IX-X | světle lila růžová /poloplňný | zelený | B2-3,FR2-3 | 2-3 | padlí |
| B | 3,2 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Heinz Richard' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Heinz Richard' | hvězdnice | 30 | 25-35 | IX-X | sytě purpurovo- růžová | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| B | 3,4 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Herbstgruss vom Bresserhof' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Herbstgruss vom Bresserhof' | hvězdnice | 30 | 35-40 | IX-X | lila růžová /poloplňný | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| B | 3,2 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Jenny' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Jenny' | hvězdnice | 40 | 50 | IX-X | purpurovočervená | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| B | 3,4 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Karminkuppel' <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Karminkuppel' | hvězdnice | 50 | 80-100 | IX-X | purpurovočervená /poloplňný | zelený | B2-3,FR2-3 | 3-5 | padlí |
| A | 3,6 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Kristina' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Kristina' | hvězdnice | 20 | 30-40 | IX-X | bílá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| A | 3,8 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Lady in Blue' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Lady in Blue' | hvězdnice | 30 | 40 | IX-X | lila modrá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Professor Anton Kippenberg' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Professor Anton Kippenberg' | hvězdnice | 30 | 30-40 | IX-X | modrofialová, žlutý střed | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| B | 3,4 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Rosemarie Sallmann' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Rosemarie Sallmann' | hvězdnice | 25 | 30-40 | IX-X | světle růžová /poloplňný | zelený | B2,FR2 | 7-9 | padlí |
| A | 3,8 | Aster | <i>novi-belgii</i> | | 'Rosenwichtel' (Dumosum Group) <i>Symphotrichum novi-belgii</i> 'Rosenwichtel' | hvězdnice | 15 | 15-20 | IX-X | tmavě růžová /poloplňný | zelený | B2,FR2 | 9-12 | padlí |
| A | 4,1 | Aster | <i>pilosus</i> | var. <i>pringlei</i> | 'Monte Cassino' <i>Symphotrichum pilosum</i> var. <i>pringlei</i> 'Monte Cassino' | hvězdnice | 60 | 80-120 | X-XI | bílá | zelený | FS1-2,M- 1-2,FR1-2 | 3-5 | |
| A | 4,0 | Aster | <i>tongolensis</i> | | 'Wartburgstern' <i>Symphotrichum tongolensis</i> | hvězdnice | 6-10 | 30-50 | V-VI | světle modře lila | zelený | B2,FR2 | 9-12 | |

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spou (ks /m²) | poznámka |
|---|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| A | 3,8 | <i>Astilbe</i> | | 'Deutschland' (Japonica Group) | | čechrava | 25 | 40-50 | VI-VII | bílá | zelený | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A | 4,0 | <i>Astilbe</i> | | 'Europa' (Japonica Group) | | čechrava | 30 | 50 | VI-VII | světle růžová | zelený | B2-3,GR- 2-3,FR2-3, G2-3 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Astilbe</i> | | 'Montgomery' (Japonica Group) | | čechrava | 30 | 60 | VI-VII | sytě červená | zelený | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Astilbe</i> | | 'Red Sentinel' (Japonica Group) | | čechrava | 30 | 50 | VI-VII | sytě červená | zelený /červenohnědý | B2-3,FR2-3,GR- 2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A | 3,9 | <i>Astilbe</i> | | 'Straussenfeder' (Thunbergii Group) | | čechrava | 50 | 80-100 | VII-VIII | růžová/převísající | zelený | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 5-7 | |
| A | 3,7 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Amethyst' | | čechrava | 50 | 80-100 | VII-VIII | lilarůžová | zelený | B2-3,FR2-3,GR- 2-3,G2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Anita Pfeifer' | | čechrava | 45 | 70 | VII-VIII | sytě lilarůžová | zelený, raší načervenale | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Brautschleier' | <i>Astilbex arendsii</i> 'Bridal Veil' | čechrava | 40 | 70-100 | VII-VIII | bílá | zelený, raší hnědozeleně | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Cattleya' | | čechrava | 40 | 100 | VII-VIII | světle lilarůžová | zelený | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 5-7 | |
| A | 4,4 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Fanal' | | čechrava | 30 | 60-70 | VII-IX | červená | zelený /tmavě bronzově červený | B2-3,GR2-3,G- 2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| A | 3,9 | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | 'Weisse Gloria' | | čechrava | 30 | 60 | VII-IX | krémově bílá | zelený | B2-3,GR2-3,FR- 2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Astilbe</i> | <i>chinensis</i> | 'Veronica Klose' | | čechrava | 25 | 25-40 | VIII-IX | růžově lila | zelený | B2,GR2,FR2,G2 | 9-12 | |
| A | 3,7 | <i>Astilbe</i> | <i>chinensis</i> | var. <i>pumila</i> | | čechrava | 20 | 20-30 | VIII-IX | světle lila | tmavě zelený | GR2,G2 | 9-12 | |
| A | 3,6 | <i>Astilbe</i> | <i>chinensis</i> | var. <i>taquetii</i> | 'Superba' | čechrava | 80 | 110 | VII-VIII | světle růžově lila | tmavě zelený | GR2,G2 | 5-7 | |
| B | 3,1 | <i>Astilboides</i> | <i>tabularis</i> | | | rodgersie | 70 | 100 | VI-VII | zelenkavě bílá | zelený | G3,GR3,WR3 | 1-2 | |
| B | 3,4 | <i>Astrantia</i> | <i>major</i> | 'Star of Beauty' (Sparkling Stars Series) | | jarmanka | 30 | 45-60 | VI-IX | červenopurpurová | zelený | GR2,B2,FR3 | 7-9 | |
| B | 3,4 | <i>Astrantia</i> | <i>major</i> | 'Star of Royals' | | jarmanka | 30 | 45-50 | VI-IX | zelenkavě bílá, světle růžový nádech | zelený | GR2,B2,FR3 | 7-9 | |
| B | 3,0 | <i>Aurinia</i> | <i>saxatilis</i> | 'Flore Pleno' | | tařice | 15 | 20-25 | IV-V | žlutá | šedozeleň | ST1,FS1,SF1,MK1 | 7-9 | stálezelená |

| | genus | species | var./f./ subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/ typ | list sezona/ podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| A | 4,8 | <i>Baptisia</i> | <i>australis</i> | | | pacholusk | 70 | 100-120 | VI-VII | sytě modrá | zelený/žlutý | FR1-2,GR1-2 | 2-3 | |
| A | 4,6 | <i>Bergenia</i> | | 'Abendglocken' | | badan | 20 | 40 | IV-V | tmavě růžová | zelený /purpurový | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,1 | <i>Bergenia</i> | | 'Abendglut' | | badan | 20 | 25-30 | IV-V | tmavě růžová | zelený /červenohnědý | GR2,FR2,ST2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Bergenia</i> | | 'Baby Doll' | | badan | 15 | 20-25 | IV-V | světle růžová | zelený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Bergenia</i> | | 'Ballawley' | | badan | 30 | 40-50 | IV-V | tmavě červená | zelený /bronzovo- zelený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,5 | <i>Bergenia</i> | | 'Brahms' | | badan | 20 | 40 | IV-V | bílá | zelený /bronzový nádech | GR2,FR2,ST2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,7 | <i>Bergenia</i> | | 'Bressingham Bountiful' | | badan | 20 | 30 | IV-V | světle růžová | zelený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Bergenia</i> | | 'Glockenturm' | | badan | 25 | 40-50 | IV-V | purpurovo- růžová | zelený/lehce načervenalý | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Bergenia</i> | | 'Pugsley's Pink' | | badan | 30 | 50-70 | IV-V | purpurovorů- žová | zelený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,9 | <i>Bergenia</i> | | 'Rosi Klose' | | badan | 15 | 35 | IV-V | světle růžová | zelený /lehký bronzo- vý přeliv | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stále- zelená, remontuje |
| A | 3,8 | <i>Bergenia</i> | | 'Silberlicht' | | badan | 25 | 30-40 | IV-V | bílá až světle růžová | zelený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,1 | <i>Bergenia</i> | <i>cordifolia</i> | | | badan | 20 | 40 | IV-V | růžová | zelený /červený | GR- 1-2,FR2,ST2,B1-2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,7 | <i>Bergenia</i> | <i>purpurascens</i> | | | badan | 20 | 30 | IV-V | purpurovo- červená | zelený/vínově červený | GR2,ST2,FR2,WR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,9 | <i>Betonica</i> | <i>macrantha</i> | 'Superba' | <i>Stachys grandiflora</i> 'Superba' | bukvice | 20 | 30-40 | VII-VIII | lilarůžová | zelený | FR2,B2,GR2 | 7-9 | |
| A | 4,0 | <i>Betonica</i> | <i>officinalis</i> | 'Hummelo' | <i>Stachys pradica</i> /monieri 'Hummelo' | bukvice | 20 | 40-50 | VII-IX | sytě růžová | zelený | B1,FR1,GR1 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Boltonia</i> | <i>asteroides</i> | | | boltonie | 60 | 80-150 | VIII-IX | bílá | modrozelený | FR2,GR2 | 3-5 | |
| A | 3,9 | <i>Brunnera</i> | <i>macrophylla</i> | | | pomněnkovec | 25 | 40 | IV-V | pomněnkově modrá | tmavě zelený | GR2,G2 | 7-9 | |
| A | 4,2 | <i>Brunnera</i> | <i>macrophylla</i> | 'Betty Bowring' | | pomněnkovec | 20 | 20-30 | IV-V | bílá | zelený | GR2,G2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Brunnera</i> | <i>macrophylla</i> | 'Jack Frost' | | pomněnkovec | 25 | 30-40 | IV-V | pomněnkově modrá | zelený, stříbr- ná kresba | B2,GR2 | 7-9 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|
| A | 3,8 | <i>Brunnera</i> | <i>macrophylla</i> | | 'Sea Heart' | pomněnkovec | 25 | 30-40 | IV-V | pomněnkově modrá | zelený, stříbrná kresba | B2,GR2 | 7-9 | |
| A | 3,5 | <i>Buglossoides</i> | <i>purpureo-caerulea</i> | | <i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> | kamejka | 20 | 30 | V-VII | purpurovočervená až purpurovomodrá | šedozeleň | GR1,-G1,ST1,FS1 | 7-9 | |
| A | 4,7 | <i>Bupthalmum</i> | <i>salicifolium</i> | | 'Dora' | volovec | 40 | 40-50 | VI-IX | žlutá | zelený | FR1-2,GR1-2,SH1-2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Calamintha</i> | <i>nepeta</i> | subsp. <i>nepeta</i> | | marulka | 30 | 30-40 | VII-IX | bílá | zelený | FR1,ST1,FS1 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Calamintha</i> | <i>nepeta</i> | subsp. <i>nepeta</i> | 'Blue Cloud' | marulka | 40 | 50-60 | VII-IX | světle modrofialová | zelený | FR1,ST1,FS1 | 7-9 | |
| B | 3,2 | <i>Campanula</i> | | | 'Kent Belle' | zvonek | 60 | 70-80 | VI-VIII | tmavě fialovomodrá | zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | |
| A | 3,9 | <i>Campanula</i> | | | 'Sarastro' | zvonek | 30 | 70-100 | VI-VIII | tmavě fialová | tmavě zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | |
| B | 3,2 | <i>Campanula</i> | <i>glomerata</i> | | 'Caroline' | zvonek | 40 | 50 | VI-VIII | světle lila růžová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Campanula</i> | <i>glomerata</i> | | 'Superba' | zvonek | 40 | 50-60 | VI-VIII | tmavě fialovomodrá | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Campanula</i> | <i>latifolia</i> | var. <i>macrantha</i> | | zvonek | 80 | 80-130 | VI-VII | sytě modrofialová | zelený | GR2,G2 | 3-5 | |
| B | 3,2 | <i>Campanula</i> | <i>persicifolia</i> | | 'Grandiflora Alba' | zvonek | 40 | 60-80 | VI-VII | bílá | zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Campanula</i> | <i>persicifolia</i> | | 'Grandiflora Coerulea' | zvonek | 40 | 60-80 | VI-VII | modrofialová | zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Campanula</i> | <i>portenschlagiana</i> | | | zvonek | 10 | 15 | VI-VIII | fialovomodrá | zelený | ST1-2,SF1-2,MK1-2 | 9-12 | |
| B | 3,2 | <i>Campanula</i> | <i>poscharskyana</i> | | | zvonek | 10 | 10-15 | VI-IX | fialovomodrá | zelený | ST1-2,MK1-2,FS1-2 | 9-12 | remontuje |
| B | 3,0 | <i>Campanula</i> | <i>trachelium</i> | | 'Bernice' | zvonek | 60 | 80 | VII-VIII | fialovomodrá /poloplňný | zelený | B2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Centaurea</i> | <i>dealbata</i> | | 'Steenbergii' | chrpa | 50 | 80 | VI-VII | purpurová, světlý střed | zelený | B1-2,FR1-2 | 3-5 | |
| B | 3,5 | <i>Centaurea</i> | <i>macrocephala</i> | | <i>Grossheimia macrocephala</i> | chrpa | 50 | 100-150 | VI-VIII | žlutá | zelený | FR2,GR2 | 2-3 | |
| B | 3,4 | <i>Centaurea</i> | <i>montana</i> | | 'Alba' | chrpa | 20 | 40 | V-VII | bílá, tmavé tyčinky | zelený, bíle chlupatý | FR1-2,GR1-2 | 7-9 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|
| B 3,4 | <i>Centaurea</i> | <i>montana</i> | | ‘Grandiflora’ | | chrpa | 25 | 40 | V-VII | modrá, tmavě purpurový střed | zelený, chlupatý | FR1-2,GR1-2 | 7-9 | remontuje |
| B 3,1 | <i>Centranthus</i> | <i>ruber</i> | var. <i>coccineus</i> | | | mavuň | 50 | 60 | VI-IX | růžovočervená | šedozeleň | FR1-2,ST1-2,FS1-2 | 5-7 | |
| B 3,0 | <i>Centranthus</i> | <i>ruber</i> | | ‘Albus’ | | mavuň | 50 | 60 | VI-IX | bílá | šedozeleň | FR1-2,ST1-2,FS1-2 | 5-7 | |
| B 3,1 | <i>Cephalaria</i> | <i>gigantea</i> | | | | hlavátka | 100 | 180-250 | VII-VIII | světle krémovožlutá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 1 | |
| A 3,8 | <i>Ceratostigma</i> | <i>plumbaginoides</i> | | | | rohoblizeň | 25 | 25-30 | VIII-IX | azurově modrá | zelený/oranžovočervený | FR1-2,GR1-2,FS1-2 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Chelone</i> | <i>obliqua</i> | | ‘Praecox Nana’ | | želvice | 30 | 40-50 | VII-VIII | sytě růžová | tmavě zelený | GR2-3,FR2-3,G2-3 | 7-9 | |
| A 4,1 | <i>Chrysogonum</i> | <i>virginianum</i> | | | | zlatoúhelník | 20 | 20-30 | V-VIII | žlutá | zelený | FR2-3,GR2-3,ST2-3,M2-3 | 7-9 | |
| A 4,3 | <i>Cimicifuga</i> | <i>racemosa</i> | var. <i>cordifolia</i> | | | ploštičník | 80 | 120-180 | VIII-IX | krémově bílá | tmavě zelený | GR2-3, G2-3 | 3-5 | |
| B 3,1 | <i>Clematis</i> | | | ‘Cote d’Azur’ | | plamének | 80 | 80-100 | VIII-IX | blankytně modrá | zelený | GR2 | 3-5 | |
| B 3,5 | <i>Convallaria</i> | <i>majalis</i> | | ‘Grandiflora’ | | konvalinka | 20 | 25 | IV-V | bílá | tmavě zelený | G2,GR2 | 9-12 | |
| A 4,3 | <i>Coreopsis</i> | <i>verticillata</i> | | ‘Grandiflora’ | | krásnoočko | 30 | 60-70 | VI-IX | zlatožlutá | zelený | FR2,B2 | 7-9 | |
| B 3,4 | <i>Coreopsis</i> | <i>verticillata</i> | | ‘Moonbeam’ | | krásnoočko | 20 | 25-30 | VI-IX | světle žlutá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A 4,2 | <i>Coreopsis</i> | <i>verticillata</i> | | ‘Zagreb’ | | krásnoočko | 15 | 30 | VI-IX | žlutá | zelený | FR2,GR2 | 7-9 | |
| A 3,7 | <i>Darmera</i> | <i>peltata</i> | | | <i>Peltiphyllum peltatum</i> | štitovka | 90 | 50-80 | IV-V | bílorůžová | zelený /červenožlutý | WR3,FR3 | 1-2 | |
| B 3,0 | <i>Delphinium</i> | | | ‘Finsteraarhorn’ | | ostrožka | 60 | 160 | VI-IX | sytě modrofialová, černé oko | zelený | B2 | 3-5 | remontuje |
| B 2,9 | <i>Delphinium</i> | | | ‘Galahad’ (Pacific hybrid Series) | | ostrožka | 60 | 180 | VI-IX | bílá/poloplňný | zelený | B2 | 3-5 | remontuje |
| B 3,3 | <i>Delphinium</i> | | | ‘Polarnacht’ (Elatum hybrid) | | ostrožka | 60 | 150 | VI-IX | tmavě hořcově modrá, bílé oko | zelený | B2 | 3-5 | remontuje |
| B 2,9 | <i>Delphinium</i> | | | Astolat Group | | ostrožka | 60 | 180 | VI-IX | růžová, bílé oko/poloplňný | zelený | B2 | 3-5 | remontuje |
| B 2,9 | <i>Delphinium</i> | | | King Arthur Group | | ostrožka | 60 | 150-160 | VI-IX | tmavě fialová, bílé oko/poloplňný | zelený | B2 | 3-5 | remontuje |

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| A 3,7 | <i>Dianthus</i> | <i>gratiano- politanus</i> | | 'Babí Lom' | | hvozdík | 5 | 15 | V-VI | zářivě růžová | šedozeleň | ST1-2,MK- 1-2,SF1-2 | 9-12 | stálezelená |
| B 3,3 | <i>Dianthus</i> | <i>gratiano- politanus</i> | | 'Schneelicht' | | hvozdík | 10 | 15-25 | V-VI | bílá | šedozeleň | ST1,MK1,SF1 | 9-12 | |
| B 3,1 | <i>Dicentra</i> | <i>eximia</i> | | | | srdcovka | 15 | 25 | VI-VII | lila purpurovorůžová | šedozeleň | GR2,ST2 | 9-12 | |
| B 3,2 | <i>Dicentra</i> | <i>formosa</i> | | | | srdcovka | 20 | 30 | VI-VIII | purpurovorůžová | světle zelený | GR2-3,ST2-3 | 9-12 | |
| A 3,7 | <i>Dicentra</i> | <i>spectabilis</i> | | | <i>Lamprocapnos spectabilis</i> | srdcovka | 60 | 80 | IV-V | růžová, bílá | modrozelený | GR2,B2 | 5-7 | |
| A 3,9 | <i>Dicentra</i> | <i>spectabilis</i> | | 'Alba' | <i>Lamprocapnos spectabilis</i> 'Alba' | srdcovka | 50 | 70 | IV-V | bílá | modrozelený | GR2,B2 | 5-7 | |
| A 3,8 | <i>Dicentra</i> | <i>spectabilis</i> | | 'Valentine' | <i>Lamprocapnos spectabilis</i> 'Valentine' | srdcovka | 40 | 60 | IV-V | červená, bílá | modrozelený | GR2,B2 | 5-7 | |
| A 3,5 | <i>Dictamnus</i> | <i>albus</i> | | | | třemdava | 60 | 80-100 | VI-VII | světle purpurovorů- žová, tmavé žilky | tmavě zelený | FR1-2,SH1-2, GR1-2 | 3-5 | |
| B 3,4 | <i>Doronicum</i> | <i>orientale</i> | | | | kamzičník | 20 | 35-40 | IV-V | žlutá | zelený | FR2,GR2 | 7-9 | |
| A 3,5 | <i>Echinacea</i> | <i>pallida</i> | | | | třapatkovka | 40 | 80 | VII-IX | růžová, oranžovo- hnědý střed | tmavě zelený | FR2,GR2 | 9-12 | struktury |
| A 3,8 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Baby Swan White' | | třapatkovka | 30 | 50 | VII-IX | bílá, tmavý střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| B 3,4 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Doubledecker' | <i>Echinacea purpurea</i> 'Doppeldecker' | třapatkovka | 60 | 80-100 | VII-IX | purpurovočervená /dvoupatrový, tmavý střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 4,2 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Fatal Attraction' | | třapatkovka | 40 | 60-70 | VII-IX | purpurovorůžová, střed tmavý | tmavě zelený | B2-3, FR2-3, GR2 | 5-7 | |
| A 4,2 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Magnus' | | třapatkovka | 40 | 80-100 | VII-IX | purpurovorůžová, střed tmavý | tmavě zelený | B2-3, FR2-3, GR2 | 5-7 | |
| B 3,3 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Pink Double Delight' (Cone- fections Series) | | třapatkovka | 30 | 40-50 | VII-IX | purpurovorůžová /poloplný | tmavě zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Primadonna Deep Rose' (Primadonna Series) | <i>Echinacea purpurea</i> 'Tiefrose' | třapatkovka | 40 | 70-80 | VII-IX | tmavě růžová, hnědooranžový střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 4,0 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'Primadonna White' (Primadonna Series) | <i>Echinacea purpurea</i> 'Prima- donna Weiss' | třapatkovka | 40 | 70-80 | VII-X | bílá, tmavý střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu /typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| A | 3,7 | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | | 'White Swan' | třapatkovka | 40 | 100 | VII-IX | bílá, tmavý střed | tmavě zelený | BR2,FR2 | 5-7 | | |
| A | 3,6 | <i>Epimedium</i> | <i>grandiflorum</i> | | 'Rubinkrone' | škornice | 15-20 | 20-25 | IV-V | fialovočervená, světlé ostruhy | bronzově zelený, na jaře načernalý | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená | |
| A | 3,8 | <i>Epimedium</i> | <i>x perralchicum</i> | | 'Frohnleiten' | škornice | 20-25 | 20-30 | IV-V | žlutá | zelený/zjara bronzové mramorování | G2-3,GR2-3 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 4,0 | <i>Epimedium</i> | <i>pinnatum</i> | subsp. <i>colchicum</i> | 'Thunderbolt' | škornice | 30 | 40 | IV-V | světle žlutá | zelený /čokoládově vínový | G2-3,GR2-3 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 3,9 | <i>Epimedium</i> | <i>x rubrum</i> | | | škornice | 20-30 | 25-30 | IV-V | růžovo-červená, bílá, jasně žlutá | zelený, na jaře načernalý /červenohnědý | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená | |
| A | 3,9 | <i>Epimedium</i> | <i>x versicolor</i> | | 'Discolor' | <i>Epimedium x versicolor</i> 'Versicolor' | škornice | 20 | 30 | IV-V | světle korálově růžová, citrónově žlutá | zelený s červeno-bronzovým mramorováním | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená |
| A | 4,1 | <i>Epimedium</i> | <i>x versicolor</i> | | 'Sulphureum' | škornice | 20-30 | 30-35 | IV-V | světle žlutá | zelený, červenohnědá kresba | G2-3,GR2-3 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 3,9 | <i>Epimedium</i> | <i>x warleyense</i> | | 'Orangekönigin' | škornice | 20-30 | 30-40 | IV-V | měděně oranžová, jasně žlutá | zelený, červený lem na jaře/ bronzovo-červený | G2-3,GR2-3 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 3,6 | <i>Erigeron</i> | | | 'Dominador' | turan | 30 | 50-70 | V-VIII | tmavě modro-fialová, žlutý střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 7-9 | | |
| A | 4,0 | <i>Erigeron</i> | | | 'Marienkiefel' | turan | 30 | 60 | V-VIII | lilarůžová | tmavě zelený | B2,FR2 | 7-9 | remontuje | |
| A | 3,5 | <i>Erigeron</i> | | | 'Strahlenmeer' | turan | 30 | 70-90 | V-VIII | světle modro-fialová, žlutý střed | tmavě zelený | B2,FR2 | 7-9 | remontuje | |
| B | 3,3 | <i>Eryngium</i> | <i>alpinum</i> | | | máčka | 30-40 | 70 | VII-VIII | modrofialová | zelený | FR2,FS2 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Eryngium</i> | <i>planum</i> | | 'Blue Glitter' | máčka | 20-30 | 60-80 | VII-VIII | ocelově modrá | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | | |
| A | 3,5 | <i>Eupatorium</i> | <i>maculatum</i> | | 'Riesenschirm' (Atropurpureum Group) | sadec | 150 | 180-220 | VII-IX | světle růžovo-purpurová | zelený, vínové lodyhy | FR2-3,WR2-3,-GR2-3 | 2-3 | | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/ m2 | poznámka | |
|---|-------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--|
| A | 3,9 | <i>Eupatorium</i> | <i>maculatum</i> | | Atropurpureum Group | sadec | 140 | 180-200 | VII-IX | tmavě růžovo- vopurpurová | zelený | FR2-3,WR3,- GR2-3 | 2-3 | | |
| B | 3,2 | <i>Euphorbia</i> | <i>amygdaloides</i> | | <i>Tithymalus amygdaloides</i> | prýšec | 30 | 30-50 | IV-VI | zelenožlutá | zelený | B1-2,FR1- 2,ST1-2 | 5-7 | stálezelená | |
| A | 3,5 | <i>Euphorbia</i> | <i>amygdaloides</i> | | 'Purpurea' | prýšec | 30 | 30-50 | IV-VI | zelenožlutá | tmavě bronzově zelený/tmavě fialovovinový | B1-2,FR1- 2,ST1-2 | 5-7 | stálezelená | |
| B | 3,3 | <i>Euphorbia</i> | <i>griffithii</i> | | 'Fireglow' | prýšec | 40 | 60-80 | V-VI | oranžovočervená | zelený, načerve- nalé mladé listy /červený | B1-2,FR1-2 | 3-5 | | |
| B | 3,3 | <i>Euphorbia</i> | <i>palustris</i> | | | prýšec | 70-140 | 80-150 | V-VI | zelenožlutá | zelený/žlutý až červený | WR4,FR2-3 | 5-7 | | |
| A | 3,6 | <i>Euphorbia</i> | <i>polychroma</i> | | <i>Euphorbia epithymoides</i> | prýšec | 20 | 30-40 | IV-VI | zelenožlutá | zelený /červenohnědý | FR1,ST1,FS1,- GR1 | 5-7 | | |
| B | 3,3 | <i>Filipendula</i> | <i>rubra</i> | | | tužebník | 70 | 100-150 | VI-VII | růžovočervená | zelený | FR3,WR3-4,GR3 | 3-5 | | |
| B | 3,3 | <i>Filipendula</i> | <i>rubra</i> | | 'Venusta' | tužebník | 70 | 100-150 | VI-VII | světle růžová | zelený | FR3,WR3-4,GR3 | 3-5 | | |
| B | 3,1 | <i>Filipendula</i> | <i>ulmaria</i> | | 'Flore Pleno' | tužebník | 50 | 80-100 | VI-VIII | krémově bílá/plný | zelený | FR3,WR3-4 | 5-7 | | |
| B | 3,2 | <i>Filipendula</i> | <i>vulgaris</i> | | | tužebník | 15 | 40-60 | VI-VII | krémově bílá | zelený | FR1,SH1 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Filipendula</i> | <i>vulgaris</i> | | 'Multiplex' | tužebník | 15 | 40 | VI-VII | krémově bílá/plný | zelený | B1,FR1 | 7-9 | | |
| B | 3,5 | <i>Gentiana</i> | <i>asclepiadea</i> | | | hořec | 40 | 40-60 | VII-IX | svítivě modrá | zelený | GR2-3,FR2-3 | 5-7 | | |
| B | 3,2 | <i>Gentiana</i> | <i>cruciata</i> | | | hořec | 40 | 30-60 | VII-VIII | svítivě modrá | zelený | FR1-2,SH1-2,- GR1-2 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 3,5 | <i>Gentiana</i> | <i>septemfida</i> | var. <i>lagodechiana</i> | | hořec | 10 | 10-15 | VII-VIII | sytě fialovomodrá | zelený | ST2,FS2,M2 | 7-9 | | |
| A | 4,3 | <i>Geranium</i> | | | 'Brempat' Patricia | kakost | 40 | 50-70 | VI-VIII | růžovopurpurová, fialové žilky a oko | zelený | B2,GR2,FR2 | 3-5 | | |
| A | 4,9 | <i>Geranium</i> | | | 'Gerwat' Rozanne | <i>Geranium</i> 'Jolly Bee' | kakost | 30 | 40-50 | V-XI | fialovomodrá, světlé oko /jednoduchý | zelený | B2, FR2, GR2 | 3-5 | |
| A | 3,9 | <i>Geranium</i> | | | 'Phillipe Vapelle' | kakost | 20 | 25-30 | V-VII | modrá, tmavě žilky | šedozelený vrás- čitý, sametově chlupatý | ST1,FR1-2 | 9-12 | | |
| A | 3,7 | <i>Geranium</i> | | | 'Tiny Monster' | kakost | 30 | 30-40 | VI-XI | purpurovočerve- ná, tmavě žilky | zelený/oranžo- vočervený až hnědočervený | FR1,SH1,- GR1,ST1 | 7-9 | | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| A | 4,1 | <i>Geranium</i> | <i>x cantabrigiense</i> | | 'Biokovo' | kakost | 15 | 15-25 | V-VI | bílá, růžové tyčinky | zelený/načervenalý | FS1-2,GR1-2,FR-1-2,SH1-2 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 4,1 | <i>Geranium</i> | <i>x cantabrigiense</i> | | 'Cambridge' | kakost | 15 | 15-25 | V-VII | růžová | zelený/načervenalý | FS1-2,GR1-2,FR-1-2,SH1-2 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 4,2 | <i>Geranium</i> | <i>x cantabrigiense</i> | | 'Karmina' | kakost | 15 | 15-25 | V-VII | růžová | zelený/načervenalý | FS1-2,GR1-2,FR-1-2,SH1-2 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 4,2 | <i>Geranium</i> | <i>x cantabrigiense</i> | | 'St Ola' | kakost | 15 | 15-25 | V-VII | bílá, růžovější | zelený/načervenalý | FS1-2,GR1-2,FR-1-2,SH1-2 | 9-12 | stálezelená | |
| A | 3,6 | <i>Geranium</i> | <i>dalmaticum</i> | | | kakost | 8 | 8-10 | V-VIII | světle růžová | zelený/oranžovo-červený | ST1-2,SF1-2,M-1-2,FS1-2 | 12-15 | stálezelená | |
| A | 4,1 | <i>Geranium</i> | <i>endresii</i> | | 'Wargrave Pink' | kakost | 25 | 30-40 | V-VII | světle růžová | zelený | GR2,FR2 | 7-9 | polostálezelená | |
| B | 3,4 | <i>Geranium</i> | <i>himalayense</i> | | 'Gravetye' | kakost | 25 | 30-40 | V-VII | modrofialová, tmavé žilky, purpurové halo, bělavý střed | zelený | FR2,B2,GR2 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Geranium</i> | <i>himalayense</i> | | 'Plenum' | <i>Geranium himalayense</i> 'Birch Double' | kakost | 25 | 30-40 | V-VII | purpurovofialová, tmavé žilky /plný | zelený | B2,FR2,ST2 | 7-9 | |
| A | 4,0 | <i>Geranium</i> | <i>ibericum</i> | subsp. <i>jubatum</i> | | kakost | 30 | 40-50 | V-VII | fialovomodrá, tmavé žilky, světlé středové halo | šedozelelý, sametově chlupatý | FR1-2,GR1-2 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Geranium</i> | <i>x johnsonii</i> | | 'Johnson's Blue' | kakost | 30 | 40-60 | VI-VIII | fialovomodrá, tmavé žilky, bělavý střed | zelený | B2,FR2 | 5-7 | | |
| A | 4,0 | <i>Geranium</i> | <i>macrorrhizum</i> | | 'Bevan's Variety' | kakost | 30 | 30-40 | V-VII | sytě růžová | zelený | GR1,FR1,FS1 | 7-9 | stálezelená | |
| A | 3,8 | <i>Geranium</i> | <i>macrorrhizum</i> | | 'Ingwersen's Variety' | <i>Geranium macrorrhizum</i> 'Walter Ingwersen' | kakost | 25 | 25-35 | V-VII | světle růžová | zelený | GR1,FR1,FS1 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,2 | <i>Geranium</i> | <i>macrorrhizum</i> | | 'Spessart' | kakost | 20 | 20-40 | V-VII | bílá, poupata červenorůžová | zelený/oranžovo-červený | GR1-2,FR-1-2,FS1-2 | 7-9 | polostálezelená | |
| A | 3,8 | <i>Geranium</i> | <i>macrorrhizum</i> | | 'White-Ness' | kakost | 20 | 20-25 | V-VII | bílá | zelený | GR1,FR1,FS1 | 7-9 | polostálezelená | |
| A | 4,0 | <i>Geranium</i> | <i>x magnificum</i> | | 'Rosemoor' | kakost | 30 | 50-60 | V-VII | fialovomodrá, tmavé žilky | zelený | B2,FR2 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Geranium</i> | <i>x oxonianum</i> | | 'Claridge Druce' | kakost | 30 | 40-50 | V-VIII | světle lila růžová, tmavé žilky | zelený | FR2,GR2 | 5-7 | polostálezelená | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/ hybridní sku- pina/série | platné jméno/sy- nonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| B 3,3 | <i>Geranium</i> | <i>phaeum</i> | var. <i>phaeum</i> | 'Samobor' | | kakost | 35 | 40-60 | IV-VII | tmavě purpurová | zelený, fialovohnědá kresba | GR2,FR2 | 7-9 | |
| A 4,1 | <i>Geranium</i> | <i>platypetalum</i> | | | | kakost | 20 | 30-40 | V-VII | fialovomodrá, tmavé žilky | zelený | GR2,FR2 | 7-9 | |
| B 3,2 | <i>Geranium</i> | <i>pratense</i> | | 'Mrs Kendall Clark' | | kakost | 40 | 50-80 | VI-VIII | světle modrá, světlé žilky | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,2 | <i>Geranium</i> | <i>pratense</i> | var. <i>pratense</i> f. <i>albiflorum</i> | | | kakost | 30 | 60-70 | VI-VII | bílá | zelený | FR1-2,GR1-2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Geranium</i> | <i>renardii</i> | | | | kakost | 15 | 20-25 | V-VI | bílá, tmavě fialové žilky | šedozelený | ST1,FS1,FR1 | 9-12 | |
| A 3,8 | <i>Geranium</i> | <i>sanguineum</i> | | 'Album' | | kakost | 15 | 30-40 | V-VIII | bílá | zelený | FR1,SH1,- GR1,ST1 | 7-9 | |
| A 3,8 | <i>Geranium</i> | <i>sanguineum</i> | | 'Aviemore' | | kakost | 15 | 25 | V-VIII | sytě růžová | zelený | ST1,FR1 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Geranium</i> | <i>sanguineum</i> | | 'Elsbeth' | | kakost | 20 | 30-40 | V-IX | sytě purpurovorangeová, bílé oko | tmavě zelený /oranžovočervený | FR1,SH1,- GR1,ST1 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Geranium</i> | <i>sanguineum</i> | | 'Max Frei' | | kakost | 15 | 15-25 | V-VIII | purpurovočervená | tmavě zelený /oranžovočervený | ST1,FR1 | 9-12 | |
| A 3,8 | <i>Geranium</i> | <i>sanguineum</i> | var. <i>striatum</i> | | | kakost | 10 | 15 | V-VIII | světle růžová, tmavé žilky | zelený | FR1,ST1,GR1 | 9-12 | |
| A 3,6 | <i>Geranium</i> | <i>sylvaticum</i> | | 'Mayflower' | | kakost | 25 | 40-60 | V-VII | fialovomodrá, bílé oko | zelený | GR2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,2 | <i>Geranium</i> | <i>wlassovianum</i> | | | | kakost | 25 | 30-40 | VII-IX | modrofialová, tmavé žilky | zelený, raší bronzově/červený | GR2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| A 3,8 | <i>Geum</i> | | | 'Feuermeer' | | kuklík | 15 | 30 | V-VI | oranžovočervená /poloplný | zelený | FR2,GR2 | 7-9 | |
| A 3,6 | <i>Geum</i> | <i>coccineum</i> | | | | kuklík | 15 | 30-40 | IV-VI | oranžovočervená | zelený | FR1-3,GR1-3 | 7-9 | |
| A 5,3 | <i>Gillenia</i> | <i>trifoliata</i> | | | | trubučka | 50 | 60-80 | VI-VII | bílá, červená | světle zelený /žlutooranžovo červený | FR2-3,WR4 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Gypsophila</i> | | | 'Rosenschlei- er' | | šater | 10 | 30-40 | VI-VIII | světle růžová/plný | šedozelený | ST1-2,MK- 1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B 3,2 | <i>Gypsophila</i> | <i>paniculata</i> | | 'Bristol Fairy' | | šater | 20 | 80-100 | VI-VIII | bílá/plný | šedozelený | B2,FR2 | 2-3 | |
| A 3,6 | <i>Gypsophila</i> | <i>paniculata</i> | | 'Compacta Plena' | | šater | 10 | 20-30 | VII-VIII | bílá/plný | šedozelený | B2,FR2 | 7-9 | |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| B 3,2 | <i>Gypsophila</i> | <i>paniculata</i> | | 'Flamingo' | | šater | 20 | 80-100 | VII-VIII | světle růžová/plný | šedo zelený | B2,FR2 | 2-3 | |
| B 3,4 | <i>Helenium</i> | | | 'Baudirektor Linne' | | záplevák | 100 | 120-150 | VII-IX | hnědočervená | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| B 3,4 | <i>Helenium</i> | | | 'Biedermeier' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Biedermeier' | záplevák | 100 | 100-140 | VII-VIII | žlutá, červená až cihlově hnědá kresba | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,8 | <i>Helenium</i> | | | 'Blütentisch Foerster' | | záplevák | 80 | 80-120 | VIII-IX | zlatožlutá, hnědý střed | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| B 3,2 | <i>Helenium</i> | | | 'Double Trouble' | | záplevák | 60 | 70-100 | VII-X | žlutá/poloplňný | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 3,7 | <i>Helenium</i> | | | 'Eldorado' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Eldorado' | záplevák | 80 | 80-120 | VII-IX | žlutá, tmavý střed | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,6 | <i>Helenium</i> | | | 'Feuersiegel' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Feuersiegel' | záplevák | 120 | 120-170 | VII-VIII | sytě žlutá, červená kresba | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,7 | <i>Helenium</i> | | | 'Kupferzweg' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Kupferzweg' | záplevák | 60 | 80-100 | VII-IX | oranžovohnědočervená | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,8 | <i>Helenium</i> | | | 'Margot' | | záplevák | 80 | 80-120 | VII-VIII | hnědočervená, žlutá, hnědý střed | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,7 | <i>Helenium</i> | | | 'Moerheim Beauty' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Moerheim Beauty' | záplevák | 80 | 80-100 | VI-IX | oranžovohnědočervená, tmavý střed | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 4,3 | <i>Helenium</i> | | | 'Rauchtocas' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Rauchtocas' | záplevák | 100 | 130-140 | VII-IX | žlutá, hnědý střed, rub plátků oranžovočervenohnědá | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,8 | <i>Helenium</i> | | | 'Rotkäppchen' | | záplevák | 50 | 80-110 | VIII-IX | červenohnědá, tmavý střed | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,6 | <i>Helenium</i> | | | 'Rubinzweg' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Rubinzweg' | záplevák | 50 | 70-90 | VII-VIII | sytě hnědočervená | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,1 | <i>Helenium</i> | | | 'Ruby Thuesday' | <i>Helenium</i> 'Ruby Tuesday' | záplevák | 40 | 50-60 | VI-IX | tmavě červená | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A 3,6 | <i>Helenium</i> | | | 'Sonnenwunder' | | záplevák | 90 | 120-140 | VII-IX | žlutá | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,8 | <i>Helenium</i> | | | 'Waltraut' | | záplevák | 70 | 70-120 | VI-VII | oranžovohnědožlutá | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 3,5 | <i>Helenium</i> | | | 'Wesergold' | <i>Helenium</i> × <i>clementii</i> 'Wesergold' | záplevák | 80 | 80-100 | VI-VIII | žlutá, hnědý střed | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Helenium</i> | | | 'Kanaria' | | záplevák | 100 | 100-140 | VII-VIII | světle žlutá | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina /série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| B 3,2 | <i>Helenium</i> | <i>hoopesii</i> | | | <i>Dugaldia hoopesii</i> , <i>Hymenoxys hoopesii</i> | záplevák | 50 | 70-80 | V-VI | žlutá | šedozelelý | FR1-2,GR1-2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Helianthus</i> | | | 'Lemon Queen' | | slunečnice | 180 | 150-200 | VII-X | citronově žlutá, žlutohnědý střed | zelený | B2,FR2,GR2 | 2-3 | |
| B 3,0 | <i>Helianthus</i> | | | 'Soleil d'Or' | | slunečnice | 120 | 120-140 | VIII-IX | zlatožlutá/plný | zelený | B1-2,FR1-2,- GR1-2 | 3-5 | |
| B 3,2 | <i>Helianthus</i> | <i>giganteus</i> | | 'Sheila's Sunshine' | | slunečnice | 150 | 180-200 | IX-XI | světle žlutá | zelený | FR1,GR1 | 2-3 | |
| A 3,6 | <i>Helianthus</i> | × <i>multiflorus</i> | | 'Meteor' | | slunečnice | 100 | 150-180 | VIII-IX | žlutá, žlutooranžový střed | zelený | B1-2,FR1-2,- GR1-2 | 2-3 | |
| B 3,2 | <i>Helianthus</i> | <i>salicifolius</i> | | – | | slunečnice | 150 | 200-300 | IX-X | žlutá | zelený, úzce kopinatý | FR1-2,B2, SH1 | 1-2 | |
| A 3,8 | <i>Heliopsis</i> | <i>helianthoides</i> | var. <i>scabra</i> | 'Goldgefieder' | | janeba | 100 | 100-130 | VI-IX | sytě žlutá/plný | zelený | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 4,1 | <i>Heliopsis</i> | <i>helianthoides</i> | var. <i>scabra</i> | 'Goldgrünherz' | | janeba | 100 | 100-130 | VII-IX | zlatožlutá, střed nazelenalý/plný | zelený | B1-2,FR1-2 | 3-5 | |
| B 3,4 | <i>Helleborus</i> | <i>argutifolius</i> | | | | čemeřice | 30 | 30-50 | III-IV | bledě zelená | tmavě modrozelený | GR1,ST1,FS1 | 5-7 | stálezelená |
| A 3,5 | <i>Helleborus</i> | <i>foetidus</i> | | | | čemeřice | 20 | 40-50 | I-IV | světle zelená | tmavě zelený | GR1-2,FR1-2,G1-2 | 3-5 | stálezelená |
| A 3,9 | <i>Helleborus</i> | | | Orientalis Group | | čemeřice | 30 | 40-60 | II-III | bílá-růžová-žlutá -purpurová-černá/tečky až skvrny (strainy) | tmavě zelený | GR2,FR2,G2 | 5-7 | stálezelená |
| A 3,6 | <i>Helleborus</i> | <i>niger</i> | | | | čemeřice | 20 | 25 | I-IV | bílá | tmavě zelený | GR2,G2,FR2 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,8 | <i>Hemerocallis</i> | | | 'Bed of Roses' | | denivka | 50 | 60-70 | VII-IX | světle růžovočervená, tmavé halo, žlutý jícen, zkadeření | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,3 | <i>Hemerocallis</i> | | | 'Bitsy' | | denivka | 30 | 45-50 | VII-IX | citronově žlutá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | polostálezelená, remontuje |
| A 4,3 | <i>Hemerocallis</i> | | | 'Corky' | | denivka | 25 | 50-60 | VI-VII | krémově žlutá, rub plátků a poupata nahnědlá | zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | |
| B 3,3 | <i>Hemerocallis</i> | | | 'Dancing Shiva' | | denivka | 30 | 60-70 | VI-VII | lososově růžová, světlé žebro, zkadeření, žlutooranžový jícen | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| B | 3,4 | <i>Hemerocallis</i> | | 'El Desperado' | | denivka | 50 | 60-70 | VI-VII | světle žlutá, vínové oko, vínové zkadeření, žlutozelený jícen | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Elegant Candy' | | denivka | 40 | 60-70 | VI-VII | růžová, tmavě růžové halo, žlutozelený jícen, zkadeření | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 4,3 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Frans Hals' | | denivka | 60 | 70-80 | VI-VII | hnědočervená se středovým světlým žebrem, žlutá | zelený | B2, FR2 | 3-5 | |
| A | 4,5 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Gentle Shepherd' | | denivka | 30 | 60-70 | VI-VII | bílá, žlutý jícen /jednoduchý | zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | polostále-zelená |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Golden Chimes' | | denivka | 30 | 60-70 | VI-VII | zlatožlutá, hnědá poupata | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Iron Gate Glacier' | | denivka | 40 | 70 | VI-VII | citronově bílá, středové bílé žebro, zelený jícen | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 3,7 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Little Joy' | | denivka | 40 | 60-80 | VII-VIII | sytě červená, žlutý jícen | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A | 4,3 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Mini Pearl' | | denivka | 30 | 40-50 | VI-VII | světle meruňkově žlutá, žlutozelený jícen | zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | remontuje |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Norton Orange' | | denivka | 40 | 70 | VI-VIII | žlutooranžová | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Red Rum' | | denivka | 30 | 40-50 | VI-VII | šarlatově červená se středovým bílým žebrem, žlutozelený jícen | zelený | B2,FR2 | 5-7 | polostále-zelená |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Siloam Nugget' | | denivka | 30 | 35-45 | VI-VII | žlutooranžová, zkadeření | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Siloam Royal Prince' | | denivka | 30 | 50 | VII-VIII | vínově purpurová, střední světlé žebro, žlutozelený jícen, zkadeření | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A | 4,3 | <i>Hemerocallis</i> | | 'South Seas' | | denivka | 30 | 60-70 | VII-VIII | meruňkově lososová s tmavým halo, žlutozelený jícen, zkadeření | zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | |
| A | 4,4 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Stella de Oro' | | denivka | 30 | 40 | VI-VII | sytě žlutá/jednoduchý | zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | remontuje |
| A | 4,3 | <i>Hemerocallis</i> | | 'Tigger' | | denivka | 30 | 60 | VI-VII | sytě oranžová s hnědočerveným středem, světlé žebro, zkadeření | zelený | B2, FR2 | 5-7 | |
| A | 4,0 | <i>Hemerocallis</i> | <i>citrina</i> | | | denivka | 60 | 120 | VI-IX | světle žlutá | zelený | B2,FR2-3 | 3-5 | |

| | genus | species | var./f. /subsp. | kultivar/hybr- ridní skupina /série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| A | 3,6 | <i>Hemerocallis</i> | <i>fulva</i> | | | denivka | 60 | 80-120 | VI-VIII | hnědavě oranžovo- červená, červené halo, světlé žebro, žlutozelený jícen | zelený | FR1-2,GR1-2 | 2-3 | |
| A | 3,7 | <i>Hemerocallis</i> | <i>lilioasphodelus</i> | | <i>Hemerocallis flava</i> | denivka | 40 | 70-80 | V-VI | světle žlutá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| A | 5,5 | <i>Heterotheca</i> | <i>camphorum</i> | var. <i>glandulissimum</i> | <i>Chrysopsis camporum</i> var. <i>glandulissimum</i> | zlatoočko | 90 | 100-130 | IX-XI | zlatožlutá | zelený | FR1-2,GR1-2 | 3-5 | |
| A | 3,9 | <i>Heuchera</i> | | | 'Caramel' | dlužicha | 25 | 30-40 | VI-VIII | krémově bílá | jantarový | B2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,5 | <i>Heuchera</i> | | | 'Frosted Violet' | dlužicha | 40 | 70-80 | VI-VII | bílá | fialový, stříbrný přeliv | B2,FR2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Heuchera</i> | | | 'Leuchtkäfer' | dlužicha | 15 | 50-60 | V-VII | šarlatově červená | zelený | B2,FR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,6 | <i>Heuchera</i> | | | 'Obsidian' | dlužicha | 20 | 40-50 | VI-VIII | zelenobílá | temně vínový | B2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,8 | <i>Heuchera</i> | | | 'Petite Ruby Frills' (Petite Series) | dlužicha | 15 | 30 | V-VIII | bělavě růžová | tmavě červeno- zelený | B2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,8 | <i>Heuchera</i> | | | 'Rakete' | dlužicha | 15 | 50-60 | V-VII | světle červená | zelený | B2, GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,0 | <i>Heuchera</i> | <i>x pruhoniciana</i> | | <i>Heuchera 'Pruhoniciana'</i> | dlužicha | 20 | 80 | V-VII | purpurovorůžová | zelený s lehkým přelivem | B2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,6 | <i>Heuchera</i> | <i>sanguinea</i> | | 'Ruby Bells' | dlužicha | 15 | 40-50 | V-VII | červená | zelený | B2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,6 | <i>Heuchera</i> | <i>villosa</i> | | 'Palace Purple' | dlužicha | 25 | 40-50 | VI-VIII | krémově bílá | tmavě červenohnědý | B2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,1 | <i>Heuchera</i> | <i>villosa</i> | var. <i>macrorhiza</i> | | dlužicha | 30 | 60-70 | VI-IX | krémově bílá | zelený | GR2,FR2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 3,6 | <i>Hosta</i> | | | 'Blue Angel' | bohyška | 60 | 90 | VI-VII | bělavě lila | modrošedo- zelený | GR2 | 2-3 | |
| A | 4,6 | <i>Hosta</i> | | | 'Devon Green' | bohyška | 40 | 55 | VI-VII | lila fialová | tmavě zelený | G2,GR2 | 7-9 | |
| A | 3,5 | <i>Hosta</i> | | | 'El Niño' (Tardiana Group) | bohyška | 40 | 60 | VI-VII | světle lila | modrosivý, bílý okraj | GR2 | 5-7 | |
| B | 3,3 | <i>Hosta</i> | | | 'Fire and Ice' | bohyška | 30 | 50-60 | VI-VII | lila fialová | bílý, tmavě zelený okraj | GR2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Hosta</i> | | | 'Frances Williams' | bohyška | 50 | 60 | VI-VII | bílá s nádechem do lila | modrozelený, žlutý až smeta- nový lem | GR2 | 2-3 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona/podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| A 3,8 | <i>Hosta</i> | | | 'Ginko Craig' | | bohyška | 20 | 50 | VII-VIII | tmavě fialová | zelený, bílý lem | ST2,GR2 | 9-12 | |
| A 3,9 | <i>Hosta</i> | | | 'Gold Standard' | | bohyška | 50 | 70 | VI-VIII | světle růžově lila | světle zelený až žlutý střed, tmavě zelený lem | B2,GR2 | 5-7 | |
| A 3,7 | <i>Hosta</i> | | | 'Honeybells' | | bohyška | 50 | 90 | VIII-IX | bílá s nádechem do lila | zelený | B2,G2,GR2 | 2-3 | |
| A 3,7 | <i>Hosta</i> | | | 'Hydon Sunset' | | bohyška | 20 | 40 | VII-IX | tmavě fialová | žlutý až bělavý | ST2,GR2 | 9-12 | |
| A 4,3 | <i>Hosta</i> | | | 'June' (Tardiana Group) | | bohyška | 40 | 55 | VI-VII | světle lila | modrošedý, žlutý až krémový střed | GR2,FR2 | 5-7 | |
| A 3,9 | <i>Hosta</i> | | | 'Krossa Regal' | | bohyška | 70 | 150 | VI-VII | světle lila fialová | zelenošedý, zvlněný okraj | B2,GR2 | 3-5 | |
| A 3,7 | <i>Hosta</i> | | | 'Liberty' | | bohyška | 60 | 120 | VII-VIII | světle lila | modrozelený, žlutý až krémový okraj | GR2 | 3-5 | |
| B 3,3 | <i>Hosta</i> | | | 'Orange Marmalade' | | bohyška | 40 | 60 | VI-VII | světle lila | zlatě žlutý, zelený lem | B2,GR2 | 5-7 | |
| A 3,8 | <i>Hosta</i> | | | 'Patriot' | | bohyška | 40 | 70 | VI-VII | lila fialová | zelený, bílý lem | B2,GR2 | 5-7 | |
| A 4,8 | <i>Hosta</i> | | | 'So Sweet' | | bohyška | 40 | 55 | VII-IX | bílá s nádechem do lila | zelený, krémový okraj | G2,GR2 | 7-9 | |
| A 4,1 | <i>Hosta</i> | | | 'Sum and Substance' | | bohyška | 60 | 80 | VII-VIII | světle lila fialová | světle zelený až žlutý | GR2,FR2 | 3-5 | |
| B 3,4 | <i>Hosta</i> | | | 'Undulata' | | bohyška | 20 | 40-60 | VI-VII | lilafialová | zelený, bíle mléčný střed | B2,GR2 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Hosta</i> | <i>lancifolia</i> | | | | bohyška | 30 | 50 | VIII-IX | levandulově fialová | tmavě zelený, lesklý | GR2,G2 | 7-9 | |
| A 3,8 | <i>Hosta</i> | <i>montana</i> | | 'Aureomarginata' | | bohyška | 50 | 70 | VI-VIII | bledě lila | tmavě zelený, žlutý až smetanový lem se žháním | GR2 | 3-5 | |
| A 4,1 | <i>Hosta</i> | <i>plantaginea</i> | | | | bohyška | 50 | 90 | VIII-IX | bílá | světle zelený, lesklý | B2,FR2,GR2 | 3-5 | |
| A 4,1 | <i>Hosta</i> | <i>sieboldiana</i> | var. <i>elegans</i> | | | bohyška | 50 | 60 | VI-VII | bílá | modrošedozelený | GR2,FR2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar /hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| A | 3,7 | <i>Hosta</i> | <i>ventricosa</i> | | | bohyška | 50 | 90 | VII-VIII | purpurová | tmavě zelený | GR2,G2 | 3-5 | | |
| A | 3,5 | <i>Hypericum</i> | <i>calycinum</i> | | | třezalka | 25 | 25-30 | VI-VIII | žlutá | modrozelený | GR1-2,G1-2 | 7-9 | polostále-zelená | |
| B | 3,2 | <i>Hypericum</i> | <i>olympicum</i> | | | třezalka | 15 | 20-30 | VI-VII | žlutá | šedozelelý | ST1,FS1,M1 | 7-9 | | |
| A | 3,7 | <i>Hyssopus</i> | <i>officinalis</i> | | | yzop | 35 | 20-60 | VII-IX | fialovomodrá | zelený | ST1,FR1 | 7-9 | stále-zelená, remontuje | |
| A | 4,1 | <i>Hyssopus</i> | <i>officinalis</i> | subsp. <i>aristatus</i> | | yzop | 25 | 20-30 | VII-IX | modrá | zelený | FR1,SH1,F-S1,ST1 | 7-9 | polostále-zelená | |
| A | 3,8 | <i>Iberis</i> | <i>sempervirens</i> | | | iberka | 15 | 15-30 | IV-V | bílá | tmavě zelený | ST1-2,MK-1-2,SF1-2 | 7-9 | stálezelená | |
| A | 4,2 | <i>Inula</i> | <i>ensifolia</i> | | 'Compacta' | oman | 20 | 20-30 | VI-VIII | zlatožlutá | tmavě zelený | M1,SH1,ST1,FR1 | 9-12 | | |
| A | 4,0 | <i>Iris</i> | | | 'Ego' (Sib) | kosatec | 40 | 60-70 | V-VI | fialovomodrá, světlý střed, kresba | zelený | B2,FR2-3 | 7-9 | | |
| A | 3,5 | <i>Iris</i> | | | 'Sibirica Alba' (Sib) | kosatec | 60 | 90 | V-VI | bílá | zelený | B2,FR2-3 | 3-5 | | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | | 'Silver Edge' (Sib) | kosatec | 50 | 60-70 | V-VI | sytě modrá, stříbrný okraj, žlutobílá kresba | zelený | B2,FR2-3 | 5-7 | | |
| A | 3,8 | <i>Iris</i> | | | 'White Swirl' (Sib) | kosatec | 40 | 60-80 | V-VI | světle žlutobílá, bílý střed | zelený | FR2-3,B2 | 7-9 | | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | | 'Babbling Brook' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 97 | V-VI | světle modrá, bílooranžový kartáček | šedozelelý | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,5 | <i>Iris</i> | | | 'Blue Rhythm' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 60 | 100 | V-VI | modrofialová, bíložluté kartáčky | šedozelelý | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Iris</i> | | | 'Brassie' (SDB) | × <i>barbata</i> (Nana-Group) | kosatec | 15 | 25 | IV-V | sytě žlutá | šedozelelý | ST1,B1,FR1 | 9-12 | |
| A | 3,6 | <i>Iris</i> | | | 'Butter and Sugar' (Sib) | | kosatec | 50 | 60-70 | V-VI | světle žlutá, bílá | zelený | B2,FR2-3 | 5-7 | remontuje |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | | 'Carfax' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 90-100 | V-VI | tmavě purpurové vnější plátky, bílá kresba, světle purpurové vnitřní plátky, žlutobílé kartáčky | šedozelelý | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |

| | ge- nus | spe- cies | var./f./ sub- sp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/ synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona/ podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|----------|
| A | 4,0 | <i>Iris</i> | | 'Cherry Garden' (SDB) | × <i>barbata</i> (Nana-Group) | kosatec | 20 | 30 | IV-V | tmavě purpurová, purpurovomodré kartáčky | šedozeleň | ST1,B1,FR1 | 9-12 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Corrida' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 90 | V-VI | světle lila modrá, žlutobílé kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Cranberry Ice' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | sytě brusinkově fialová, žlutobílé kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Iris</i> | | 'Dance Ballerina Dance' (Sib) | | kosatec | 60 | 60-80 | V-VI | světle purpurová, bělavě lila střed, červenožlutý jícen | zelený | B2,FR2-3 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Deputé Nomblot' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | tmavě purpurovočervená, bílá kresba vnější plátky, světle růžově purpurová s bronzově zlatým nádechem vnitřní plátky, žlutooranžové kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Desert Echo' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | světle zlatožluté vnější plátky s tmavě vínovými tečkami a tmavě fialovopurpurovou rozpíťou centrální linkou, citronově žluté vnitřní plátky, hnědožluté kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Frost and Flame' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 90 | V-VI | bílá, červenooranžové kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Hellcat' (IB) | × <i>barbata</i> (Media-Group) | kosatec | 35 | 50-60 | V | tmavě modrofialové vnější plátky, světle modré vnitřní plátky, modré kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 9-12 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Jewel Tone' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | tmavě vínovohnědé vnější plátky, světlejší tón vnitřních plátek, hnědožluté kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Langport Phoenix' (IB) | × <i>barbata</i> (Media-Group) | kosatec | 35 | 50-60 | V | tmavě modré vnější plátky, světle modré vnitřní plátky, modré kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 9-12 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Margarita' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 70 | V-VI | modrofialovopurpurové vnější plátky, ledově bílé vnitřní plátky, modrobílé kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Mrs Horace Darwin' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 70 | V-VI | bílá, tmavě fialové žilky, žlutobílé kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Navy Strut' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | tmavě fialovomodrá, modré kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/ hybridní sku- pina/série | platné jméno/ synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Ola Kalá' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-100 | V-VI | zlatožlutá, oranžovožlutý kartáček | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Pink Cameo' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | vnější plátky krémové s lehkým růžovým nádechem, sladce světle růžové vnitřní plátky, oranžovožluté kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Seminole' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80-90 | V-VI | sytě vínovofialové vnější plátky, středně fialové vnitřní plátky, žluté kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Shipshape' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 90 | V-VI | sytě modrá, žluté kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Stepping Out' (TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 80 | V-VI | fialová, bílá, modrožlutý kartáček | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Stockholm' (SDB) | × <i>barbata</i> (Nana-Group) | kosatec | 15 | 25-30 | IV-V | citronově žlutá a ž krémový střed plátků, lila modré kartáčky | šedozeleň | ST1,B1,FR1 | 9-12 | |
| B | 3,3 | <i>Iris</i> | | 'Winner's Circle'(TB) | × <i>barbata</i> (Elatior-Group) | kosatec | 50 | 70-90 | V-VI | tmavě fialová, bílý flek na středu vnějších plátků, světle modré kartáčky | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,8 | <i>Iris</i> | <i>foetidissima</i> | | | kosatec | 40 | 50-60 | VI | světle fialová, kresba | zelený | GR1-2,G1-2 | 7-9 | stálezeleň, oranžové plody |
| A | 3,5 | <i>Iris</i> | <i>orientalis</i> | | <i>Iris ochroleuca</i> | kosatec | 60 | 60-80 | VI-VII | krémově bílá, žluté fleky | zelený | FR1-2,GR2 | 5-7 | |
| A | 3,7 | <i>Iris</i> | <i>pallida</i> | | | kosatec | 35 | 90-120 | VI | světle modrofialová, žluté kartáčky | šedozeleň | FR1-2, B1-2, FS1-2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Iris</i> | <i>pallida</i> | 'Variegata' | | kosatec | 35 | 60-80 | VI | světle modrofialová, žluté kartáčky | šedozeleň, krémově žluté pruhy | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Iris</i> | <i>sibirica</i> | | | kosatec | 40 | 60-100 | V-VI | modrofialová, žlutohnědá kresba | zelený | FR2-3 | 7-9 | |
| A | 3,7 | <i>Kalimeris</i> | <i>incisa</i> | 'Blue Star' | <i>Aster incisus</i> 'Blue Star' | hvězdicovec | 40 | 50-60 | VI-IX | světle lila modrá | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A | 4,5 | <i>Kalimeris</i> | <i>incisa</i> | 'Madiva' | <i>Aster incisus</i> 'Madiva' | hvězdicovec | 60 | 80-90 | VII-X | bělavě lila | zelený/ žlutooranžový | B2,GR2,FR2 | 3-5 | |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona/podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| B 3,3 | <i>Kalimeris</i> | <i>yomena</i> | | 'Shogun' | <i>Aster yomena</i> 'Aurea' | hvězdnicovec | 50 | 60-100 | VI-IX | světle lila růžová | zelený s bílým lemem, okraje s nádechem do růžova/žlutý lem | B2,FR2 | 3-5 | |
| A 4,2 | <i>Kirengeshoma</i> | <i>palmata</i> | | | | kirengeša | 70 | 70-100 | VIII-IX | světle žlutá | zelený | GR2,G2 | 3-5 | |
| B 3,0 | <i>Knautia</i> | <i>macedonica</i> | | | | chrastavec | 30 | 60-100 | VII-VIII | tmavě červená | zelený | FR1-2,GR1-2 | 3-5 | |
| B 3,0 | <i>Knautia</i> | <i>macedonica</i> | | 'Mars Midget' | | chrastavec | 30 | 40-50 | VII-VIII | tmavě purpurovo-červená | zelený | B1-2,FR1-2 | 5-7 | |
| B 3,2 | <i>Lamium</i> | <i>galeobdolon</i> | | 'Hermann's Pride' | | hluchavka | 15 | 15-20 | V-VI | žlutá | zelený, stříbrné fleky | G2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,6 | <i>Lamium</i> | <i>orvala</i> | | | | hluchavka | 40 | 40-60 | V-VI | nachovopurpurová | zelený | G1-2,GR1-2 | 5-7 | |
| A 3,8 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Alba Nana' | | levandule | 20 | 30 | VII-VIII | bílá | šedozeleň | B1,FR1 | 9-12 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Dow4' Melissa Lilac | | levandule | 40 | 50-60 | VII-VIII | bílá s nádechem do růžova | šedozeleň | B1,FR1 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,6 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Dwarf Blue' | | levandule | 20 | 30 | VII-VIII | modrá | šedozeleň | B1,FR1 | 9-12 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Hidcote' veg. | <i>Lavandula</i> 'Hidcote Blue' | levandule | 25 | 40 | VII-VIII | modrofialová | šedozeleň | B1,FR1 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Munstead' | | levandule | 25 | 40 | VII-VIII | fialovomodrá | šedozeleň | B1,FR1 | 7-9 | stálezelená |
| B 3,3 | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> | | 'Rosea' | | levandule | 25 | 40 | VI-VIII | světle růžová | šedozeleň | B1,FR1 | 9-12 | stálezelená |
| B 3,4 | <i>Lavandula</i> | × <i>intermedia</i> | | 'Grosso' | | levandule | 40 | 60-80 | VII-VIII | fialovomodrá | šedostříbřitý | B1,FR2 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,5 | <i>Leucanthemella</i> | <i>serotina</i> | | | | luhovnice | 100 | 100-130 | IX-X | bílá | zelený | FR2-3,GR2-3,B2-3 | 3-5 | |
| B 3,1 | <i>Leucanthemum</i> | × <i>superbum</i> | | 'Christine Hagemann' | | kopretina | 50 | 60-80 | VII-VIII | bílá/poloplný | zelený | B2 | 5-7 | |
| B 3,0 | <i>Leucanthemum</i> | × <i>superbum</i> | | 'Fiona Coghil' | | kopretina | 50 | 60-70 | VI-VII | bílá/plný | zelený | B2 | 5-7 | |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar /hybridní skupina /série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| B 3,0 | <i>Leucanthemum</i> | <i>x superbum</i> | | 'Lubná' | | kopretina | 40 | 60 | VI-VIII | bílá/poloplný | zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| B 3,3 | <i>Leucanthemum</i> | <i>x superbum</i> | | 'Wirral Supreme' | | kopretina | 50 | 70-90 | VII-VIII | bílá/plný | zelený | B2 | 3-5 | |
| A 3,7 | <i>Liatris</i> | <i>spicata</i> | | 'Floristan Violet' | | šuškarda | 30 | 80 | VII-IX | fialová | zelený | B2,FR2 | 9-12 | struktury |
| A 3,6 | <i>Liatris</i> | <i>spicata</i> | | 'Floristan Weiss' | | šuškarda | 30 | 80 | VII-IX | bílá | zelený | B2,FR2 | 9-12 | struktury |
| B 3,3 | <i>Ligularia</i> | | | 'The Rocket' | | popelivka | 70 | 150-170 | VII-VIII | žlutá | zelený | GR2-3,FR3,WR3 | 2-3 | struktury |
| A 3,6 | <i>Ligularia</i> | | | 'Zepter' | | popelivka | 70 | 180 | VII-VIII | oranžovožlutá | zelený | GR2-3,FR3,WR3 | 2-3 | struktury |
| A 3,6 | <i>Ligularia</i> | <i>dentata</i> | | 'Desdemona' | | popelivka | 60 | 90 | VII-IX | zlatožlutá | zelený, rub a řapíky tmavě purpurově hnědé | GR2-3,FR3,WR3 | 2-3 | struktury |
| B 3,1 | <i>Ligularia</i> | <i>dentata</i> | | 'Othello' | | popelivka | 60 | 100 | VIII-IX | zlatožlutá až oranžovožlutá | zelenavě hnědý, rub tmavě purpurovohnědý | GR2-3,FR3,WR3 | 2-3 | struktury |
| B 3,2 | <i>Ligularia</i> | <i>dentata</i> | | 'Sommergold' | | popelivka | 60 | 80 | VIII-IX | zlatožlutá | zelený | GR2-3,FR3,WR3 | 2-3 | struktury |
| B 3,5 | <i>Ligularia</i> | <i>przewalskii</i> | | | | popelivka | 50 | 90-130 | VII-VIII | žlutá | zelený | GR2-3,FR-2-3,WR2-3 | 2-3 | struktury |
| B 3,2 | <i>Linum</i> | <i>flavum</i> | | 'Compactum' | | len | 20 | 20-30 | VI-VIII | žlutá | modrozelený | FR1,SH1,ST1,FS1 | 9-12 | |
| B 3,1 | <i>Linum</i> | <i>perenne</i> | | | | len | 20 | 30-60 | VI-VIII | světle fialovomodrá | šedozeleň | FR1,SH1,ST1,FS1 | 7-9 | |
| B 3,1 | <i>Lychnis</i> | <i>chalcedonica</i> | | | | kohoutek | 40 | 60-100 | VI-VII | zářivě červená | zelený | GR2,G2,FR2 | 9-12 | |
| B 3,2 | <i>Lychnis</i> | <i>viscaria</i> | | 'Splendens Plena' | <i>Lychnis viscaria</i> 'Plena' | smolnička | 15 | 40-50 | V-VII | purpurovorůžová/plný | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | stálezeleň |
| B 3,0 | <i>Lysimachia</i> | <i>ciliata</i> | | 'Firecracker' | | vrbina | 40 | 60-80 | VI-VIII | žlutá | vínově hnědý | FR3,GR3,WR3 | 7-9 | |
| B 3,1 | <i>Lysimachia</i> | <i>clethroides</i> | | | | vrbina | 40 | 60-80 | VII-IX | bílá | zelený | FR2-3,GR-2-3,WR3 | 7-9 | |
| B 3,0 | <i>Lysimachia</i> | <i>punctata</i> | | | | vrbina | 40 | 60-80 | VI-IX | žlutá | zelený | GR2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| B 3,0 | <i>Lysimachia</i> | <i>punctata</i> | | 'Alexander' | | vrbina | 40 | 50-70 | VI-IX | žlutá | světle zelený, bílý lem | GR2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| B 3,4 | <i>Lythrum</i> | <i>salicaria</i> | | | | kyprej | 70 | 100-120 | VII-VIII | purpurovorůžová | zelený | FR3,WR3-4 | 5-7 | remontuje |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|
| A 3,5 | <i>Lythrum</i> | <i>salicaria</i> | | 'Robert' | | kyprej | 35 | 60-80 | VII-VIII | tmavě purpurovorůžová | zelený | FR3,B3,WR3 | 7-9 | |
| B 3,3 | <i>Lythrum</i> | <i>salicaria</i> | | 'Zigeunerblut' | | kyprej | 70 | 90-120 | VI-VIII | tmavě růžová | zelený | FR3,B3,WR3 | 5-7 | |
| B 3,3 | <i>Macleaya</i> | <i>cordata</i> | | | | okecek | 150 | 250 | VII-IX | bílá, krémově žlutá poupata, okrově hnědé plodenství | šedomodrozelený | FR1-2,GR1-2 | 1-2 | |
| B 3,1 | <i>Melissa</i> | <i>officinalis</i> | | | | meduňka | 40 | 40-80 | VII-IX | bílá | zelený | FR2,GR2 | 5-7 | |
| B 3,0 | <i>Monarda</i> | | | 'Adam' | | zavinutka | 70 | 80-100 | VII-IX | sytě červená | zelený | B1-2 | 5-7 | padlí, struktury |
| B 3,2 | <i>Monarda</i> | | | 'Croftway Pink' | | zavinutka | 80 | 90-110 | VII-IX | světle růžová, purpurový střed | zelený | B1-2 | 3-5 | padlí, struktury |
| B 3,0 | <i>Monarda</i> | | | 'Gardenview Scarlet' | | zavinutka | 80 | 90-100 | VII-IX | jasně červená | zelený | B1-2 | 3-5 | struktury |
| B 3,2 | <i>Monarda</i> | | | 'Kardinal' | | zavinutka | 100 | 100-120 | VII-IX | purpurovočervená | zelený | B1-2 | 3-5 | struktury |
| B 3,0 | <i>Monarda</i> | | | 'Schneewittchen' | | zavinutka | 70 | 80-100 | VII-IX | bílá | zelený | B1-2 | 5-7 | padlí, struktury |
| B 3,1 | <i>Monarda</i> | | | 'Scorpion' | | zavinutka | 80 | 100 | VII-IX | purpurovofialová | zelený | B1-2 | 3-5 | padlí, struktury |
| B 3,0 | <i>Monarda</i> | | | 'Squaw' | | zavinutka | 80 | 100 | VII-IX | šarlatově červená | zelený | B2 | 3-5 | struktury |
| A 3,8 | <i>Nepeta</i> | | | 'Dropmore' | | šanta | 40 | 40-60 | VI-IX | fialovomodrá | šedozeleň | FR1-2, B1-2 | 7-9 | |
| A 4,0 | <i>Nepeta</i> | | | 'Six Hills Giant' | | šanta | 40 | 50-60 | V-X | fialovomodrá | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 5-7 | remontuje |
| A 3,7 | <i>Nepeta</i> | <i>× faassenii</i> | | 'Senior' | | šanta | 20 | 25-30 | V-VIII | světle modrofialová | šedozeleň | FR1-2,B1-2,ST1-2 | 7-9 | remontuje |
| B 3,3 | <i>Nepeta</i> | <i>grandiflora</i> | | 'Dawn to Dusk' | | šanta | 50 | 60-80 | VI-IX | světle růžová | šedozeleň | FR2,GR2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Nepeta</i> | <i>grandiflora</i> | | 'Pool Bank' | | šanta | 80 | 100-120 | VI-VIII | modrofialová | šedozeleň | FR2,GR2 | 3-5 | |
| A 4,8 | <i>Nepeta</i> | <i>kubanica</i> | | | | šanta | 60 | 60-90 | VI-IX | tmavě fialová | zelený /zlatožlutý | FR2, GR2, FS2 | 3-5 | struktury |
| B 3,0 | <i>Nepeta</i> | <i>nuda</i> | | 'Accent' | | šanta | 60 | 80-100 | VI-VIII | bělavě světlemodrá | zelený | FR1-2 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Nepeta</i> | <i>racemosa</i> | | 'Grog' | | šanta | 20 | 25-35 | V-VIII | modrofialová | šedozeleň | ST1,FR1 | 9-12 | remontuje |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina /série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|
| B 3,4 | <i>Nepeta</i> | <i>racemosa</i> | | 'Little Titch' | | šanta | 15 | 20-25 | V-VI | fialovomodrá | šedozeleň | ST1,FR1 | 9-12 | remontuje |
| A 3,6 | <i>Nepeta</i> | <i>racemosa</i> | | 'Snowflake' | | šanta | 20 | 20-30 | V-VII | bílá | šedozeleň | ST1,FR1 | 9-12 | remontuje |
| A 3,9 | <i>Nepeta</i> | <i>racemosa</i> | | 'Walker's Low' | | šanta | 30 | 60-80 | V-VII | levandulově modrá | šedozeleň | FR1-2,FS1-2 | 5-7 | remontuje |
| B 3,3 | <i>Nepeta</i> | <i>sibirica</i> | | 'Souvenir d'André Chaudron' | | šanta | 50 | 50-70 | VI-VII | fialovomodrá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| B 3,3 | <i>Oenothera</i> | <i>fruticosa</i> | subsp. <i>glauca</i> | 'Sonnenwende' | | pupalka | 15 | 50-70 | VI-VIII | sytě žlutá, červená pupata | tmavě zelený | B2,FR2 | 7-9 | |
| A 3,7 | <i>Oenothera</i> | <i>macrocarpa</i> | | | <i>Oenothera missouriensis</i> | pupalka | 10 | 20-25 | VI-IX | žlutá | světle zelený | ST1,MK1,FS1 | 9-12 | |
| A 3,6 | <i>Omphalodes</i> | <i>verna</i> | | | | pupkovec | 15 | 20-25 | IV-V | pomněnkově modrá, světlý střed | zelený | GR2,G2 | 9-12 | |
| A 3,8 | <i>Origanum</i> | | | 'Rosenkuppel' | | dobromysl | 25 | 40-60 | VII-IX | lila růžová | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A 3,8 | <i>Origanum</i> | <i>laevigatum</i> | | 'Herrenhausen' | | dobromysl | 25 | 40-60 | VII-IX | světle purpurovorangeová, tmavě fialové listeny | šedozeleň | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A 4,0 | <i>Origanum</i> | <i>vulgare</i> | | 'Compactum' | | dobromysl | 15 | 20-25 | VII-IX | světle růžová | zelený | FR1,SH1,FS1,ST1 | 9-12 | stálezelená |
| A 3,5 | <i>Paeonia</i> | | | 'Bartzella' | | pivoňka | 70 | 90 | V-VI | žlutá, červené oko /poloplň | tmavě zelený | B2 | 1-2 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | | | 'Chocolate Soldier' | | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | čokoládově vínová, zčásti petalizované žluté prašníky | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,9 | <i>Paeonia</i> | | | 'Early Scout' | | pivoňka | 45 | 50-60 | V-VI | tmavě vínová, žluté prašníky /jednoduchý | tmavě zelený | B1-2,FR1-2 | 3-5 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | | | 'Flame' | | pivoňka | 60 | 80 | V-VI | světivě purpurovorangeová, žluté prašníky /jednoduchý | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | | | 'Walter Mains' | | pivoňka | 60 | 80 | V-VI | sytě červená, červené a žluté prašníky | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 3,9 | <i>Paeonia</i> | <i>daurica</i> | subsp. <i>mlokosewitschii</i> | | <i>Paeonia mlokosewitschii</i> | pivoňka | 50 | 50-70 | IV-V | světle žlutá, žluté prašníky /jednoduchý | modrozelený | FR1-2,GR1-2 | 3-5 | |
| A 4,2 | <i>Paeonia</i> | <i>x festiva</i> | | 'Rubra Plena' | <i>Paeonia officinalis</i> 'Rubra Plena' | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | tmavě purpurovočervená /plný | tmavě zelený | B2 | 3-5 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Adolphe Rousseau' | | pivoňka | 70 | 90 | V-VI | třešňově červená, žluté prašníky/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Avalanche' | <i>Paeonia lactiflora</i> 'Albatre' | pivoňka | 60 | 90 | V-VI | bílá/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,8 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Bowl of Beauty' | | pivoňka | 60 | 70 | V-VI | růžová, krémový střed, petalizované prašníky | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 3,6 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Bunker Hill' | | pivoňka | 60 | 90 | V-VI | světle purpurovočervená /plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Doctor Alexander Fleming' | | pivoňka | 60 | 90 | V-VI | tmavě růžová/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 3,5 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Duchesse de Nemours' | | pivoňka | 60 | 100 | V-VI | krémově bílá, nažloutlý střed/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Eduis Superba' | | pivoňka | 60 | 100 | V-VI | sytě růžová/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| B 3,3 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Félix Crousse' | | pivoňka | 60 | 80 | V-VI | purpurovočervená/plný | tmavě zelený /červený | B2 | 2-3 | |
| B 3,4 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Festiva Maxima' | | pivoňka | 60 | 90 | V-VI | bílá, purpurovočervené fleky/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,1 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Jan van Leeuwen' | | pivoňka | 60 | 80 | V-VI | bílá, žluté prašníky /jednoduchý | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Kansas' | | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | purpurovočervená /plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'L'étincelante' | | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | purpurovorrůžová /jednoduchý | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 3,8 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Laura Dessert' | | pivoňka | 60 | 90 | V-VI | bílá, krémově žluté prašníky /plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 3,8 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Le Cygne' | | pivoňka | 60 | 80 | V-VI | žlutavě bílá, žluté prašníky/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Monsieur Jules Elie' | | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | sytě růžová/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,0 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Neon' | | pivoňka | 50 | 80 | V-VI | sytě růžová, světle růžové petalizované prašníky | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,4 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Nippon Beauty' | | pivoňka | 50 | 70 | V-VI | tmavě červená, žluté petalizované prašníky | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |
| A 4,2 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Sarah Bernhardt' | | pivoňka | 80 | 90 | V-VI | světle růžová, tmavší střed/plný | tmavě zelený | B2 | 2-3 | |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/hybrid-ní skupina /série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|
| A | 3,5 | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | | 'Shirley Temple' | pivoňka | 60 | 100 | V-VI | bílá, sladce narůžovělé probarvení, krémový střed/plný | tmavě zelený | B2 | 5-7 | |
| A | 3,6 | <i>Paeonia</i> | <i>tenuifolia</i> | | | pivoňka | 20 | 40-50 | IV-V | tmavě červená, žluté prašníky /jednoduchý | tmavě zelený | FR1,GR1,SH1 | 5-7 | |
| A | 4,2 | <i>Paeonia</i> | <i>tenuifolia</i> | | 'Plena' | pivoňka | 20 | 30-40 | IV-V | tmavě červená/plný | tmavě zelený | FR1,GR1,SH1,FS1 | 5-7 | |
| B | 3,4 | <i>Papaver</i> | | | 'Patty's Plum' (Oriental Group) | mák | 30 | 60-75 | V-VI | vínovopurpurová, tmavé fleky a střed | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B | 3,0 | <i>Papaver</i> | | | 'Perry's White' (Oriental Group) | mák | 30 | 80 | V-VI | bílá, černopurpurový střed | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A | 4,8 | <i>Papaver</i> | | | 'Türkenlouis' (Oriental Group) | mák | 60 | 70-80 | V-VI | oranžovočervená, černé oko, roztržený okraj plátků | zelený | B1-2,FR 1-2 | 7-9 | |
| B | 3,0 | <i>Parthenium</i> | <i>integrifolium</i> | | | řimbaba | 80 | 60-100 | VII-IX | bílá | zelený | FR1-2,GR1-2 | 3-5 | |
| A | 3,7 | <i>Penstemon</i> | <i>digitalis</i> | | 'Husker Red' | dračík | 40 | 80-100 | VI-VIII | bílá | vínově hnědý | B1-2,FR1-2 | 7-9 | stálezelená |
| A | 4,6 | <i>Persicaria</i> | <i>amplexicaulis</i> | | | rdesno | 60 | 80-100 | VII-X | červená | zelený | GR2,FR2-3 | 3-5 | |
| B | 3,2 | <i>Persicaria</i> | × <i>fennica</i> | | 'Johanniswolke' | rdesno | 100 | 130-170 | VI-VIII | krémově bílá | zelený | GR1-3,FR-1-3,ST1-3 | 1 | |
| B | 3,2 | <i>Persicaria</i> | <i>weyrichii</i> | | | rdesno | 120 | 150 | VIII-IX | bílá | šedozeleň | FR2,GR2 | 1 | |
| A | 4,3 | <i>Phlomis</i> | <i>russeliana</i> | | | sápa | 30 | 60-100 | VI-VIII | světle žlutá | zelený | FR1,FS1,GR1 | 5-7 | stálezelená |
| A | 3,6 | <i>Phlomis</i> | <i>tuberosa</i> | | | sápa | 40 | 100-150 | VI-VII | purpurovofialová | zelený | FR1,GR1 | 3-5 | |
| A | 4,5 | <i>Phlox</i> | × <i>arendsii</i> | | 'Hesperis' | plamenka | 70 | 100-130 | VII-IX | lila | zelený | B2-3,FR2-3 | 5-7 | padlí |
| B | 3,0 | <i>Phlox</i> | <i>maculata</i> | | 'Alpha' | plamenka | 60 | 80-100 | VI-VIII | sladce lila růžová | zelený | B2-3,FR2-3 | 5-7 | |
| B | 3,0 | <i>Phlox</i> | <i>maculata</i> | | 'Natascha' | plamenka | 70 | 90-120 | VI-VIII | světle růžová, bílá, tmavě růžové pruhy | zelený | B2-3,FR2-3 | 5-7 | |
| B | 3,2 | <i>Phlox</i> | <i>maculata</i> | | 'Rosalinde' | plamenka | 60 | 80-100 | VI-VIII | purpurovorůžová | zelený | B2-3,FR2-3 | 5-7 | padlí |
| B | 3,4 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Blue Paradise' | plamenka | 60 | 90-100 | VI-VIII | fialovomodrá | zelený až načervenalý | B2-3 | 5-7 | |
| A | 3,5 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Bright Eyes' | plamenka | 60 | 60-80 | VII-VIII | pastelově růžová, tmavé rozpité oko | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno /synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka | |
|---|-------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| A | 3,8 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'David' | plamenka | 50 | 70-80 | VI-VIII | bílá | zelený | B2-3 | 5-7 | | |
| B | 3,4 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Düsterlohe' | plamenka | 60 | 90-120 | VI-VIII | tmavě purpurovofialová | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí | |
| A | 3,8 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Europa' | plamenka | 60 | 60-80 | VI-IX | bílá až narůžovělá, purpurově růžové oko | zelený | B2-3 | 5-7 | | |
| A | 3,8 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Flamingo' | plamenka | 60 | 60-80 | VIII-IX | lososově růžová, purpurovorůžové oko | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí | |
| A | 3,5 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Franz Schubert' | plamenka | 70 | 80-100 | VI-IX | světle fialový přeliv, bílý střed | zelený | B2-3 | 5-7 | | |
| B | 3,4 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Hochgesang' | plamenka | 60 | 100-120 | VIII-IX | bílá | zelený | B2-3,FR2-3 | 5-7 | | |
| A | 5,0 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Little Princess' | plamenka | 50 | 60-80 | VI-IX | růžová, bílé oko | zelený | B2-3 | 5-7 | | |
| A | 3,7 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Miss Pepper' | <i>Phlox paniculata</i> 'Barci' | plamenka | 60 | 80-90 | VIII-IX | světle růžová, tmavé oko | zelený | B2-3 | 5-7 | |
| A | 4,1 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Mount Fuji' | <i>Phlox paniculata</i> 'Fujiyama' | plamenka | 90 | 100-120 | VII-IX | bílá | zelený | B2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Nachodka' | plamenka | 80 | 100 | VII-IX | světle růžová, světlé halo, purpurovorůžové oko | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí | |
| B | 3,1 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Orange' | <i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'/ 'Prince of Orange' | plamenka | 40 | 60-70 | VII-VIII | lososově oranžová, purpurové oko | zelený | B2-3 | 5-7 | skvrnitost |
| A | 4,0 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Šeříkový' | plamenka | 50 | 70-90 | VII-IX | lilapurpurová | zelený | B2-3 | 5-7 | | |
| B | 3,2 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Starfire' | plamenka | 60 | 80-90 | VII-VIII | oranžovočervená | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí | |
| A | 4,3 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Úspeh' | <i>Phlox paniculata</i> 'Úspech'/ 'Laura' | plamenka | 40 | 50-70 | VII-IX | tmavě fialová s bílou hvězdou | zelený | B2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Wilhelm Kesselring' | plamenka | 30 | 50-60 | VI-VIII | tmavě purpurovofialová, bílý hvězdicový střed, tmavý jícen | zelený | B2-3 | 5-7 | padlí | |
| A | 4,5 | <i>Phlox</i> | <i>paniculata</i> | | 'Windsor' | plamenka | 60 | 70-90 | VI-IX | lososově růžová s tmavě růžovočerveným okem | zelený | B2-3 | 5-7 | | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina /série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka | |
|---|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|
| A | 3,6 | <i>Physostegia</i> | <i>virginiana</i> | | 'Summer Snow' | řetězovka | 50 | 70-80 | VII-IX | bílá | zelený | B2,FR2-3 | 7-9 | | |
| A | 3,8 | <i>Physostegia</i> | <i>virginiana</i> | | 'Vivid' | řetězovka | 40 | 60 | VII-IX | purpurovorůžová | zelený | B2,FR2-3 | 7-9 | | |
| A | 3,7 | <i>Physostegia</i> | <i>virginiana</i> | var. <i>speciosa</i> | 'Bouquet Rose' | řetězovka | 50 | 70-80 | VII-IX | růžová | zelený | B2,FR2 | 7-9 | | |
| A | 3,9 | <i>Platycodon</i> | <i>grandiflorus</i> | | 'Fuji Blue' | zvonkovec | 30 | 40-50 | VII-VIII | sytě fialovomodrá | modravě zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | | |
| A | 3,7 | <i>Platycodon</i> | <i>grandiflorus</i> | | 'Fuji White' | zvonkovec | 40 | 40-50 | VII-VIII | bílá | modravě zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | | |
| A | 3,8 | <i>Platycodon</i> | <i>grandiflorus</i> | | 'Hakone Blue' | zvonkovec | 40 | 50 | VII-VIII | jasně modrá/plný | modravě zelený | B2,FR2,GR2 | 7-9 | | |
| A | 4,2 | <i>Platycodon</i> | <i>grandiflorus</i> | | 'Mariesii' | zvonkovec | 40 | 40-60 | VI-VIII | modrofialová | zelený | FR2,GR2 | 7-9 | | |
| B | 3,4 | <i>Polemonium</i> | <i>caeruleum</i> | | | jiřnice | 20 | 60-70 | V-VII | fialovomodrá | zelený | FR3,GR3 | 5-7 | | |
| B | 3,2 | <i>Polemonium</i> | <i>caeruleum</i> | subsp. <i>caeruleum</i> f. <i>album</i> | | jiřnice | 20 | 40 | V-VII | bílá | zelený | B2-3,FR2-3 | 7-9 | | |
| A | 4,2 | <i>Polygonatum</i> | | | 'Weihenstephan' | kokořík | 80 | 80-100 | V-VI | krémově bílá | zelený | G2,GR2 | 3-5 | | |
| A | 3,7 | <i>Polygonatum</i> | <i>odoratum</i> | | | kokořík | 40 | 40 | V-VI | bílá | zelený | GR1-2,G1-2,FS1-2 | 7-9 | | |
| B | 3,2 | <i>Potentilla</i> | <i>atrosanguinea</i> | | | mochna | 30 | 40-50 | VI-VIII | tmavě červená | šedozelelý | FR2,GR2,FS2 | 7-9 | | |
| A | 3,5 | <i>Potentilla</i> | <i>nepalensis</i> | | 'Miss Willmott' | mochna | 40 | 40-60 | VI-IX | světle růžová, červené oko, tmavé žilky | zelený | B1-2,FR1-2,GR1-2 | 7-9 | | |
| B | 3,3 | <i>Pulmonaria</i> | | | 'Majesté' | plicník | 20 | 25-30 | IV-V | růžovofialová, modrá | stříbrný, zelený okraj | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená | |
| A | 3,7 | <i>Pulmonaria</i> | | | 'Ocupol' Opal | plicník | 25 | 25-30 | III-V | světle modrá | zelený, stříbřité bílé fleky | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená | |
| B | 3,2 | <i>Pulmonaria</i> | | | 'Sissinghurst White' | plicník | 20 | 25-30 | IV-V | bílá | zelený, stříbřité fleky | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená | |
| A | 3,5 | <i>Pulmonaria</i> | <i>rubra</i> | | | plicník | 25 | 25-30 | III-V | červená | zelený | GR2-3, G2-3 | 7-9 | polostále-zelená | |
| A | 3,8 | <i>Pulmonaria</i> | <i>saccharata</i> | | 'Frühlingshimmel' | <i>Pulmonaria</i> 'Spring Beauty' | plicník | 20 | 25-30 | IV-V | světle modrá | zelený, stříbrné tečky | G2-3,GR2-3 | 9-12 | polostále-zelená |
| A | 3,7 | <i>Pulsatilla</i> | <i>vulgaris</i> | subsp. <i>grandis</i> | 'Papageno' | koniklec | 10 | 15 | III-IV | bílá-lila-růžová-fialová / třepenité (strain) | zelený | FR1,SH1,ST1,FS1 | 9-16 | | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina /série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| A 4,4 | <i>Pycnanthemum</i> | <i>pilosum</i> | | | | mátovec | 50 | 60-80 | VIII-IX | bílá, lila tečky | zelený | GR1-3,FR1-3,ST1-3 | 5-7 | |
| A 5,0 | <i>Rodgersia</i> | | | 'Die Stolze' | | bronzolist | 60 | 100-150 | VI-VII | světle růžová | tmavě zelený | G2-3,GR2-3 | 2-3 | |
| A 3,9 | <i>Rodgersia</i> | <i>aesculifolia</i> | | | | bronzolist | 60 | 100-160 | VI-VII | zelenkavě krémově bílá, s růžovým nádechem | zelený s bronzovým nádechem | G2-3,GR2-3 | 2-3 | |
| A 3,8 | <i>Rodgersia</i> | <i>pinnata</i> | | | | bronzolist | 60 | 100-120 | VI-VII | žlutavě bílá | zelený | G2-3,GR2-3 | 2-3 | |
| A 3,7 | <i>Rodgersia</i> | <i>podophylla</i> | | 'Rotlaub' | | bronzolist | 60 | 100-130 | VI-VII | krémově bílá | zelený, raší bronzově | G2-3,GR2-3 | 2-3 | |
| A 4,9 | <i>Rudbeckia</i> | <i>fulgida</i> | var. <i>sullivantii</i> | 'Goldsturm' | | třapatka | 40 | 50-70 | VII-X | zlatožlutá, černý střed | tmavě zelený | B2,FR2, GR2 | 7-9 | struktury |
| A 3,5 | <i>Rudbeckia</i> | <i>laciniata</i> | | 'Goldkugel' | | třapatka | 100 | 140-160 | VIII-IX | sytě žlutá/plný | zelený | B2-3,FR2-3 | 2-3 | |
| A 3,5 | <i>Rudbeckia</i> | <i>laciniata</i> | | 'Goldquelle' | | třapatka | 70 | 70-90 | VII-IX | zářivě žlutá/plný | zelený | B2-3,FR2-3 | 3-5 | |
| B 3,3 | <i>Rudbeckia</i> | <i>maxima</i> | | | | třapatka | 60 | 200 | VIII-IX | zlatožlutá, zelený až hnědý střed | šedozeleň | FR2-3,WR3 | 2-3 | |
| B 3,0 | <i>Rudbeckia</i> | <i>occidentalis</i> | | | | třapatka | 60 | 200 | VII-IX | černohnědá, zelené listeny | šedozeleň | FR2-3,GR2-3 | 2-3 | |
| A 4,7 | <i>Rudbeckia</i> | <i>subtomentosa</i> | | 'Henry Eilers' | | třapatka | 70 | 100-125 | VII-X | žlutá/paprsčité okvětní plátky | zelený | B2,FR2,GR2 | 5-7 | |
| B 3,2 | <i>Salvia</i> | <i>lavandulifolia</i> | | | <i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> | šalvěj | 20 | 20-30 | VI-VIII | světle modře lila | šedozeleň | ST1,FS1,FR1 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,8 | <i>Salvia</i> | <i>nemorosa</i> | | 'Amethyst' | | šalvěj | 30 | 60-70 | VI-IX | purpurově lila | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | remontuje |
| A 4,3 | <i>Salvia</i> | <i>nemorosa</i> | | 'Caradonna' | | šalvěj | 30 | 40-50 | V-VIII | tmavě fialová | zelený, fialové lodyhy | FR2,SH2 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Salvia</i> | <i>nemorosa</i> | | 'Ostfriesland' | | šalvěj | 20 | 40 | V-IX | fialovomodrá, purpurovůžové listeny | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | remontuje |
| A 3,5 | <i>Salvia</i> | <i>nemorosa</i> | | 'Wesuwe' | | šalvěj | 30 | 40-50 | V-IX | modrofialová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| B 3,4 | <i>Salvia</i> | <i>officinalis</i> | | | | šalvěj | 40 | 30-60 | VI-VIII | světle fialovomodrá | šedozeleň | FR1,ST1,FS1 | 5-7 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Salvia</i> | <i>officinalis</i> | | 'Berggarten' | | šalvěj | 40 | 40-60 | VI-VIII | fialovomodrá | šedozeleň | B1,ST1,FR1 | 5-7 | stálezelená |
| B 3,3 | <i>Salvia</i> | <i>officinalis</i> | | 'Purpurascens' | | šalvěj | 30 | 40-60 | VI-VIII | fialovomodrá | šedozeleň s fialovým nádechem | B1,FR1,ST1 | 7-9 | stálezelená |

| | genus | species | var./f./sub-sp. | kultivar/ hybridní sku- pina/série | platné jméno/ synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| B 3,3 | <i>Salvia</i> | <i>pratensis</i> | | 'Rose Rhapsody' | | šalvěj | 20 | 40-50 | V-VIII | sladce světle růžová | zelený | FR1,SH1 | 7-9 | remontuje |
| B 3,4 | <i>Salvia</i> | <i>pratensis</i> | | 'Swan Lake' (Ballet Series) | | šalvěj | 20 | 50 | V-VIII | bílá | zelený | FR1,SH1 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Salvia</i> | × <i>sylvestris</i> | | 'Blauhügel' | | šalvěj | 25 | 40 | V-IX | modrá | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Salvia</i> | × <i>sylvestris</i> | | 'Mainacht' | | šalvěj | 30 | 40-50 | V-IX | tmavě fialovomodrá | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | remontuje |
| B 3,3 | <i>Salvia</i> | × <i>sylvestris</i> | | 'Rügen' | | šalvěj | 25 | 35 | VI-IX | fialovomodrá | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | |
| A 3,9 | <i>Salvia</i> | × <i>sylvestris</i> | | 'Schneehügel' | <i>Salvia</i> × <i>sylvestris</i> 'Adrian' | šalvěj | 25 | 40 | V-IX | bílá | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | remontuje |
| A 3,7 | <i>Salvia</i> | × <i>sylvestris</i> | | 'Viola Klose' | | šalvěj | 25 | 30-40 | V-IX | tmavě modrofialová | zelený | B1-2,FR1-2 | 7-9 | remontuje |
| B 3,2 | <i>Salvia</i> | <i>verticillata</i> | | 'Purple Rain' | | šalvěj | 30 | 40-60 | V-IX | fialovopurpurová | zelený | FR1,B1 | 7-9 | |
| B 3,2 | <i>Sanguinaria</i> | <i>canadensis</i> | f. <i>multiplex</i> | 'Plena' | | krvavěnka | 25 | 15 | IV-V | bílá/plný | modrozelený | G2,GR2 | 9-12 | |
| B 3,0 | <i>Santolina</i> | <i>pinnata</i> | subsp. <i>neapolitana</i> | 'Edward Bowles' | | svatolína | 35 | 40-50 | VII-VIII | žlutá | šedobílý | ST1,B1 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,5 | <i>Satureja</i> | <i>montana</i> | | | | saturejka | 15 | 20-40 | VII-VIII | bílá | zelený | ST1-2,FS- 1-2,FR1-2 | 7-9 | stálezelená |
| B 3,4 | <i>Scabiosa</i> | <i>caucasica</i> | | 'Blausiegel' | | hlaváč | 40 | 60-80 | VI-IX | levandulově modrá, světlý střed | šedozelelý | B1-2,FR1-2,FS- 1-2,SH1-5 | 5-7 | |
| A 3,5 | <i>Scabiosa</i> | <i>caucasica</i> | | 'Miss Willmott' | | hlaváč | 40 | 60-80 | VI-IX | zelenkavě krémově bílá | šedozelelý | B1-2,FR1-2,FS- 1-2,SH1-3 | 5-7 | |
| A 3,5 | <i>Scabiosa</i> | <i>caucasica</i> | | 'Nachtfalter' | | hlaváč | 60 | 60-80 | VI-IX | sytě modrofi- alová | šedozelelý | B1-2,FR1-2,FS- 1-2,SH1-4 | 5-7 | |
| A 3,6 | <i>Scabiosa</i> | <i>caucasica</i> | | 'Stäfa' | | hlaváč | 40 | 60-80 | VI-IX | tmavě modrofialová | šedozelelý | B1-2,FR1-2,FS- 1-2,SH1-2 | 5-7 | |
| A 3,7 | <i>Sedum</i> | | | 'Carl' | <i>Hylotelephium</i> 'Carl' | rozchodníkovec | 25 | 20-35 | VIII-IX | purpurovolila | šedozelelý | FR1-2,ST- 1-2,B1-2 | 7-9 | struktury |
| A 4,3 | <i>Sedum</i> | | | 'Herbstfreude' | <i>Hylotelephium</i> (Herbstfreude Group) 'Herbstfreude' | rozchodníkovec | 30 | 40-50 | VIII-X | růžovohnědo- červená | světle zelený | FR1-2,FS- 1-2,ST1-2 | 7-9 | struktury |
| A 4,1 | <i>Sedum</i> | | | 'Matrona' | <i>Hylotelephium</i> 'Matrona' | rozchodníkovec | 40 | 50-70 | VIII-IX | světle starorůžová | světle zelený /červený nádech | FS1-2,ST- 1-2,FR1-2 | 7-9 | struktury |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona/podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka | |
|---|-------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| A | 3,8 | <i>Sedum</i> | | 'Mr Goodbud' | <i>Hylotelephium</i> 'Mr Goodbud' | rozchodníkovec | 25 | 30-50 | VIII-IX | sytě purpurovorůžová | šedo zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | struktury | |
| A | 3,5 | <i>Sedum</i> | | 'Munstead Dark Red' | <i>Hylotelephium</i> 'Munstead Red' | rozchodníkovec | 30 | 40-50 | IX-X | tmavě hnědočervená | šedo zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | struktury | |
| A | 3,5 | <i>Sedum</i> | | 'Picollete' | <i>Hylotelephium telephium</i> (<i>Atropurpureum</i> Group) 'Picolette' | rozchodníkovec | 20 | 20-35 | VIII-IX | nachově růžová | purpurovo-červený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | | |
| A | 4,6 | <i>Sedum</i> | <i>kamtschaticum</i> | var. <i>floriferum</i> | 'Weihenstephaner Gold' | rozchodník | 10 | 10-20 | VII-VIII | žlutá | tmavě zelený | FR1-3,ST1-3,M-1-3,WR1-3 | 12-15 | stálezelená | |
| A | 3,8 | <i>Sedum</i> | <i>spectabile</i> | | 'Brillant' | <i>Hylotelephium spectabile</i> (Brilliant Group) 'Brillant' | rozchodníkovec | 20 | 40-50 | VIII-IX | lilarůžová | světle zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | struktury |
| B | 3,4 | <i>Sedum</i> | <i>spectabile</i> | | 'Iceberg' | <i>Hylotelephium spectabile</i> 'Iceberg' | rozchodníkovec | 30 | 30-40 | VIII-IX | bílá | světle zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | struktury |
| A | 3,9 | <i>Sedum</i> | <i>spectabile</i> | | 'Rosenteller' | <i>Hylotelephium spectabile</i> (Brilliant Group) 'Rosenteller' | rozchodníkovec | 25 | 30-40 | VIII-IX | tmavě lila růžová | světle zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 7-9 | struktury |
| B | 3,3 | <i>Silphium</i> | <i>perfoliatum</i> | | | mužák | 130 | 180-250 | VIII-IX | žlutá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 1 | | |
| A | 4,3 | <i>Smilacina</i> | <i>racemosa</i> | | | <i>Maianthemum racemosum</i> | přestupka | 40 | 40-60 | V-VI | krémově bílá, plod hrozen červených bobulí | zelený | GR2,G2 | 5-7 | |
| A | 3,5 | <i>Solidago</i> | | | 'Laurin' | | zlatobýl | 30 | 30-40 | VIII-IX | tmavě žlutá | tmavě zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| B | 3,4 | <i>Solidago</i> | | | 'Strahlenkrone' | <i>Solidago</i> 'Crown of Rays' | zlatobýl | 30 | 50-70 | VII-VIII | žlutá | zelený | B2,FR2 | 5-7 | |
| A | 3,7 | <i>Solidago</i> | <i>caesia</i> | | | | zlatobýl | 40 | 60-100 | IX-X | žlutá | modravě zelený | FR1-2,GR1-2,G1-2 | 5-7 | |
| A | 3,6 | <i>Solidago</i> | <i>× luteus</i> | | 'Lemore' | <i>Solidaster luteus</i> 'Lemore' | zlatnice | 50 | 60-70 | VII-IX | světle žlutá až žlutá | zelený | B1,FR1 | 7-9 | |
| B | 3,4 | <i>Solidago</i> | <i>rugosa</i> | | 'Fireworks' | | zlatobýl | 60 | 100-120 | VIII-IX | žlutá | zelený | B2,FR2 | 2-3 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/ hybridní skupina/ série | platné jméno/ synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| A 3,8 | <i>Stachys</i> | <i>byzantina</i> | | 'Big Ears' | <i>Stachys byzantina</i> 'Countess Helen von Stein' / 'Helen von Stein Zeppelin' | čistec | 20 | 40-60 | VII-IX | fialovorůžová | stříbřitě šedobílý, chlupatý | FR1,FS1,ST1 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,8 | <i>Stachys</i> | <i>byzantina</i> | | 'Silver Carpet' | <i>Stachys byzantina /olympica</i> 'Silberteppich' | čistec | 20 | 20-30 | VII-IX | fialovorůžová | stříbřitě šedobílý, chlupatý | FR1,FS1,ST1 | 7-9 | stálezelená |
| B 3,2 | <i>Stokesia</i> | <i>laevis</i> | | | | stokesie | 20 | 30-40 | VII-IX | světle fialovomodrá | zelený | FR1-2,ST1-2 | 7-9 | stálezelená |
| B 3,2 | <i>Symphytum</i> | <i>azureum</i> | | | | kostival | 30 | 40-80 | IV-V | azurově modrá | tmavě zelený | GR2,FR2 | 5-7 | |
| B 3,3 | <i>Symphytum</i> | <i>grandiflorum</i> | | | | kostival | 20 | 25-30 | IV-V | krémová | tmavě zelený | G2,GR2 | 5-7 | |
| A 3,8 | <i>Tanacetum</i> | <i>coccineum</i> | | 'Queen Mary' | | řimbaba | 20 | 60 | V-VII | světle růžová | zelený | B2 | 7-9 | |
| A 3,8 | <i>Tanacetum</i> | <i>coccineum</i> | | 'Regent' | | řimbaba | 20 | 80 | V-VI | sytě červená | zelený | B2 | 7-9 | |
| B 3,1 | <i>Tanacetum</i> | <i>haradjanii</i> | | | <i>Chrysanthemum haradjanii</i> | vrtič | 8 | 20-30 | VI-VII | žlutá | bílošedý | ST1,MK1,SF1 | 7-9 | |
| B 3,2 | <i>Tellima</i> | <i>grandiflora</i> | | | | mitrovka | 15 | 50-70 | V-VI | zelenožlutá | zelený /načervenalý | G2,GR2 | 7-9 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Thalictrum</i> | <i>aquilegifolium</i> | | | | žlutucha | 60 | 100-120 | V-VII | lila růžová | zelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| B 3,3 | <i>Thalictrum</i> | <i>aquilegifolium</i> | | 'Purpureum' | | žlutucha | 50 | 80-100 | V-VI | purpurovorůžová | zelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| A 3,5 | <i>Thalictrum</i> | <i>delavayi</i> | | | <i>Thalictrum dipterocephalum</i> | žlutucha | 50 | 120-180 | VII-X | světle lila růžová, krémově žluté tyčinky | zelený | GR2,G2 | 5-7 | |
| B 3,0 | <i>Thalictrum</i> | <i>delavayi</i> | | 'Album' | | žlutucha | 50 | 80-120 | VII-X | bílá | zelený | GR2,G2 | 5-7 | |
| A 3,7 | <i>Thalictrum</i> | <i>flavum</i> | subsp. <i>glaucum</i> | | | žlutucha | 50 | 120-150 | VII-VIII | žlutá | modrozelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| A 3,6 | <i>Thalictrum</i> | <i>rochebruneanum</i> | | | | žlutucha | 50 | 120-250 | VII-VIII | světle lila fialová, krémově žluté tyčinky | modrozelený | FR2-3,GR2-3 | 3-5 | |
| A 4,5 | <i>Thermopsis</i> | <i>chinensis</i> | | | | vličinec | 60 | 60-80 | V-VI | žlutá | zelený | FR2,GR2 | 5-7 | |
| A 3,8 | <i>Thymus</i> | | | 'Redstart' | | mateřídouška | 5 | 5 | V-VII | světle purpurovorůžová | zelený/vínový | ST1,MK1 | 9-12 | stálezelená |
| B 3,1 | <i>Thymus</i> | <i>vulgaris</i> | | | | tymián | 15 | 20-30 | VII-IX | světle fialová | šedozelený | ST1,FS1,FR1 | 9-12 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | dobu květu | barva květu/typ | list sezona /podzim | stanoviště | spon ks/m2 | poznámka |
|---|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
| B | 3,3 | <i>Tiarella</i> | <i>cordifolia</i> | | | mitrovnička | 10 | 20 | IV-V | krémově bílá | zelený/načervenalý | G2,GR2 | 9-12 | stálezelená |
| B | 3,0 | <i>Tradescantia</i> | | 'Bilberry Ice' (Andersoniana Group) | | podeňka | 40 | 50 | V-IX | bílá až světle fialovopurpurová | zelený | FR2-3,B-2-3,WR2-3 | 5-7 | |
| B | 3,0 | <i>Tradescantia</i> | | 'Concord Grape' (Andersoniana Group) | | podeňka | 40 | 50 | V-IX | purpurovofialová | šedozeleň | FR2-3,B-2-3,WR2-3 | 5-7 | |
| A | 3,5 | <i>Tradescantia</i> | | 'Innocence' (Andersoniana Group) | | podeňka | 40 | 50 | V-IX | bílá, žlutý střed | zelený | FR2-3,B-2-3,WR2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Tradescantia</i> | | 'Karminglut' (Andersoniana Group) | | podeňka | 30 | 40 | V-IX | purpurovočervená | zelený | FR2-3,B-2-3,WR2-3 | 5-7 | |
| A | 3,8 | <i>Tradescantia</i> | | 'Zwanenburg Blue' (Andersoniana Group) | | podeňka | 40 | 50 | V-IX | sytě fialovomodrá | zelený | FR2-3,B-2-3,WR2-3 | 5-7 | |
| B | 3,2 | <i>Tricyrtis</i> | <i>hirta</i> | | 'Miyazaki' | liliovka | 40 | 60-80 | VIII-X | bílá, purpurové fličky | zelený | GR2 | 7-9 | |
| A | 4,0 | <i>Trollius</i> | <i>chinensis</i> | | 'Golden Queen' | upolín | 25 | 60-80 | VI-VII | světle oranžová | zelený | B2,FR3,WR3-4 | 7-9 | |
| B | 3,4 | <i>Trollius</i> | × <i>cultorum</i> | | 'Earliest of All' | upolín | 25 | 50-60 | V-VI | zlatožlutá | zelený | B2,FR3,WR3-4 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Trollius</i> | × <i>cultorum</i> | | 'Orange Globe' | upolín | 25 | 70 | V-VI | žlutooranžová | zelený | B2,FR3,WR3-4 | 7-9 | |
| B | 3,1 | <i>Uvularia</i> | <i>grandiflora</i> | | | uvularie | 30 | 40-60 | IV-V | žlutá | zelený | G2,GR2 | 7-9 | |
| A | 3,6 | <i>Veratrum</i> | <i>nigrum</i> | | | kýchavice | 50 | 100-150 | VII-VIII | černovínová | zelený | GR2-3,FR2-3 | 3-5 | struktury |
| B | 3,4 | <i>Vernonia</i> | <i>noveboracensis</i> | | | ocelka | 90 | 160-180 | VII-IX | tmavě purpurová | zelený | FR2-3,WR2-3,-GR2-3 | 2-3 | struktury |
| B | 3,3 | <i>Veronica</i> | | | 'Eveline' | rozrazil | 20 | 40-50 | VI-VIII | purpurovofialová | zelený | B2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| B | 3,4 | <i>Veronica</i> | | | 'Pink Damask' | rozrazil | 35 | 60 | VI-VIII | sytě růžová | zelený | B2-3,FR2-3 | 7-9 | |
| A | 4,4 | <i>Veronica</i> | <i>austriaca</i> | subsp. <i>teucrium</i> | 'Knallblau' | rozrazil | 15 | 25-30 | V-VIII | středně modrá | zelený | FR1-2,GR1-2,SH1-2 | 7-9 | |
| A | 3,9 | <i>Veronica</i> | <i>gentianoides</i> | | | rozrazil | 5 | 30-50 | V-VI | světle modrá | zelený | FR2-3,WR3-4 | 9-12 | |
| B | 3,3 | <i>Veronica</i> | <i>longifolia</i> | | 'Blauriesin' | rozrazil | 30 | 60-80 | VI-VIII | modrá | zelený | B2-3,WR2-3 | 7-9 | |
| A | 3,5 | <i>Veronica</i> | <i>longifolia</i> | | 'Christa' | rozrazil | 40 | 60 | VI-VII | fialovomodrá | zelený | B2-3,FR2-3 | 7-9 | |

| | genus | species | var./f./subsp. | kultivar/hybridní skupina/série | platné jméno/synonymum | české jméno | výška listu | výška květu | doba květu | barva květu/typ | list sezona/podzim | stanoviště | sponks/m2 | poznámka |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| A 3,6 | <i>Veronica</i> | <i>spicata</i> | | 'Heidekind' | <i>Pseudolysimachion spicatum</i> 'Heidekind' | rozrazil | 10 | 20-30 | VI-VIII | purpurovo-růžová | zelený | B2,FR2,ST2 | 9-12 | |
| A 3,5 | <i>Veronica</i> | <i>spicata</i> | | 'Rotfuchs' | <i>Pseudolysimachion spicatum</i> 'Rotfuchs' | rozrazil | 20 | 30-40 | VI-VIII | růžovočervená | zelený | B2,FR2,ST2 | 9-12 | |
| B 3,2 | <i>Veronica</i> | <i>spicata</i> | | 'Ulster Blue Dwarf' | <i>Pseudolysimachion spicatum</i> 'Ulster Blue Dwarf' | rozrazil | 5 | 20-30 | VI-VII | tmavě modrá | zelený | B2,FR2,ST2 | 9-12 | |
| A 3,8 | <i>Veronica</i> | <i>spicata</i> | subsp. <i>incana</i> | 'Silver Carpet' | <i>Veronica incana</i> 'Silberteppich', <i>Pseudolysimachion incanum</i> 'Silver Carpet' | rozrazil | 10 | 25 | VI-VII | fialovomodrá | šedozeleň | ST1,FS1,FR1 | 9-12 | |
| A 3,6 | <i>Veronicastrum</i> | | | 'Adoration' | | rozrazilovec | 80 | 100-120 | VII-VIII | světle lila růžová | zelený | FR1-2,ST-1-2,B1-2 | 5-7 | struktury |
| A 3,8 | <i>Veronicastrum</i> | | | 'Red Arrows' | | rozrazilovec | 80 | 90-110 | VII-VIII | purpurově červenorůžová | zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | struktury |
| A 3,6 | <i>Veronicastrum</i> | <i>virginicum</i> | | 'Album' | | rozrazilovec | 80 | 90-120 | VII-VIII | bílá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | struktury |
| A 3,7 | <i>Veronicastrum</i> | <i>virginicum</i> | | 'Diane' | | rozrazilovec | 80 | 90-110 | VII-VIII | bílá | zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | struktury |
| A 3,8 | <i>Veronicastrum</i> | <i>virginicum</i> | | 'Fascination' | | rozrazilovec | 90 | 120-150 | VI-VIII | lila | zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | struktury |
| A 3,8 | <i>Veronicastrum</i> | <i>virginicum</i> | | 'Lavendelturm' | | rozrazilovec | 100 | 140-180 | VI-VIII | světle lila fialová | zelený | FR2-3,GR2-3 | 5-7 | struktury |
| A 4,7 | <i>Waldsteinia</i> | <i>geoides</i> | | | | mochnička | 15 | 15-20 | IV-VI | žlutá | zelený | G1-2,GR1-2 | 7-9 | stálezelená |
| A 4,2 | <i>Waldsteinia</i> | <i>ternata</i> | | | | mochnička | 8 | 10-15 | IV-V | žlutá | zelený | G2,GR1-2 | 9-12 | stálezelená |
| A 3,7 | <i>Yucca</i> | <i>filamentosa</i> | | | | vláknatka | 50 | 150-180 | VII-VIII | bílá | šedozeleň | FR1,ST1,FS1 | 2-3 | stálezelená |

PARAMETRY ROSTLIN

NÁZVOSLOVÍ *(Ondřej Fous, Jiří Uher)*

Proměna chápání botanické nomenklatury je natolik dynamická, že na ni reálný zahradnický svět nestíhá reagovat. Praktičnost a schopnost být každodenním manuálem je pro nás důležitá, a proto jsme se rozhodli dát přednost vesměs zaužívaným názvům. Nicméně jsme se pokusili vždy uvést jak platné jméno, tak i některá užívaná starší jména. Primární ověřovací autoritou nám byla RHS, ale srovnávali jsme i další dostupné zdroje a názory. V případě rodu *Aster* jsme se shodli jednoznačně, že pro praxi je důležité, aby zůstaly pohromadě. Pro rod *Actaea* a *Cimicifuga* jsme respektovali platný stav. U pojmenovaných hybridů je doplněno jméno křížence, například *Helenium x clementii*. Ve věci kultivarů jsme pokud možno uváděli šlechtitelské skupiny pro lepší orientaci ve stále složitějších hybridech. Zohledňovali jsme i drobné kvalitativní odchylky, tak důležité v naší práci, jako například semenné linie (strain) nebo vegetativní kultivary (veg.). Odchytili jsme co nejvíce přeložených či zkomolených názvů, vše je uvedeno v synonymech. Co se kosatců týče, viz níže.

KOSATCE *(Zuzana Caspers)*

Zahradnické členění kartáčkatých kosatců podle výšky rostlin:

Nízké kosatce

(Iris barbata nana hort.): 20–40 cm.

- Základní nízké kosatce – SDB (Standard Dwarf Bearded) s výškou 20–40 cm.
- Miniaturní nízké kosatce – MDB (Miniature Dwarf Bearded), hybridní zahradní kosatce nižší než 20 cm.

Střední kosatce *(Iris barbata media hort.)*: 41–75 cm

- Střední bradaté kosatce – IB (Intermediate Bearded)
- Obrubové bradaté kosatce – BB (Border Bearded)
- Miniaturní vysoké bradaté kosatce – MTB (Miniature Tall Bearded)

Vysoké kosatce *(Iris barbata elatior hort.)*: nad 75 cm

- Malokvěté diploidní kosatce – skupina hybridních potomků především z křížení *I. pallida* × *I. variegata*
- Vysoké bradaté kosatce (syn. Americké velkokvěté kosatce) – TB (Tall Bearded)

ČESKÉ NÁZVY *(Ondřej Fous)*

Pokusili jsme se vyhledat maximum našich jmen i nad rámec našeho běžného užití. Zejména staré katalogy zahradnických závodů a prvotní botanická literatura nám byly cennou studnicí. Každé to jméno někdy někdo vymyslel a buď se chytlo nebo nikoliv. Dobře známý je nám všem příklad *Bergenia* vs. *badan*. Kdo vymyslí hezké jméno pro *Amsonia*, dostane jistě botanický metál. Ta by si ho zasloužila. .

VÝŠKA LISTU A KVĚTU *(Ondřej Fous, Zuzana Čechovská)*

Záhonové podmínky z rostlin dokážou vytáhnout neuvěřitelné věci. V prvním roce po založení bývají rostliny až o třetinu vyšší. Po ujmoutí a dosažení zápoje se běžně srovnají. Také při deštivém květnu a červnu v prodlužovacím růstu se vychylují směrem nahoru. Naopak suchá jara vedou ke zkrácení. Reakce není stejná, rostliny s výrazným zásobním orgánem hospodaří s vodou lépe. Podobně se to daleko méně projeví u rostlin kvetoucích v druhé polovině léta a později. Starší pereny, nejsou-li mrveny, bývají nižší coby jedna ze známek stagnace. Výška v listu je velmi relativní, ale snažili jsme se uvádět účinnou výšku listového krytu po větší část vegetace, protože právě tento faktor je nejdůležitější pro dosažení zápoje. Rozdíl výšky květu vůči listu je velmi dynamický, část rostlin kvete doslova na listech, kokoříky pod listy a *darmera* si kvete dočista bez nich.

DOBA KVĚTU *(Ondřej Fous, Zuzana Čechovská)*

V naší zemi je třeba dobu květu chápat dle hlavních souvisejících fenofází v dané nadmořské výšce. Teplé nížiny mohou být o týdny napřed oproti horským údolím. Obvykle v průběhu května se rozdíl srovnávají. Také deštivé léto bez slunce může dramaticky posouvat dobu kvetení. Za dobu květu považujeme hlavní kvetení. Přičítání pozdních remontů s velkou letní pauzou k časnému kvetení a vytváření nekonečně kvetoucích peren neodpovídá skutečnosti. Pokud rostlina za dobrých podmínek remontuje přirozeně, uvádíme to v poznámce. Často je remont ale vyvolán zejména záhonovou péčí a kulturními zásahy zahradníka. V nultém a prvním roce po založení kvetou pereny dle své schopnosti vykvést, tabulky nečtouc.

BARVA KVĚTU A LISTU *(Ondřej Fous, Zuzana Čechovská)*

Subjektivita barevného vnímání umožňuje pouze rámcový popis. Rozsah práce neumožňuje převzít plný kód RHS Colour Charts, ale navázali jsme alespoň na ustálené řazení a pojmenování některých barev včetně problematické purpurové. Řazení dominantní barvy na druhé místo je sjednoceno a na příkladu modrofialové *Lavandula* 'Hidcote' a fialovomodré *Lavandula* 'Munstead' je zjevné. U listů upozorňujeme na pestré sorty, barevnolisté i případně barevně rašící a výraznější podzimní barviče.

STANOVIŠTNÍ OKRUHY (dle Richard Hansen/ Josef Sieber, Zuzana Čechovská, Ondřej Fous)

Česká perenářská škola tradičně vychází z fyto geografického chápání stanoviště (Markéta Müllerová) s respektem vůči původnímu biotopu rostliny, podobně jako část britské školy (Martin Rix, Roger Phillips). Vnímání oblastí původu introdukovaných i domácích rostlin je podstatným faktorem i u záhonové kultury. Německý systém kódů může být vodítkem, pokud jste schopni si ho zaužívat a dostatečně zjednodušit. Systém normalizace lze ve společenstvech s vnitřní dynamikou považovat za překonaný, ale jelikož zde „záhon“ má přiznanou škatulku, může napovědět. Podstatné je upozornit na značné rozdíly v kódech uváděných různými zdroji. V kontinentálních nížinách není prakticky nadále možné pěstovat na plném slunci celou řadu peren jako v přímořských a podhorských lokalitách. Týká se to například rodů *Astilbe*, *Anemone*, *Astrantia* nebo *Hosta*, která mají v našich pahorkatinách docela jiný potenciál než v našich sporých viničních oblastech.

SPONY (Ondřej Fous, Zuzana Čechovská)

V záhonech je nutné spony podřídit zejména životní strategii konkrétní pereny. Bohužel jsme často velkou obětí normalizace produkce a chápání peren v 70. letech a podnes panující doktríny nastavené na masivní pokryvy v monokulturách. Ty neumožňují dynamické zakládání s respektem vůči společenstvu. V záhonové kultuře se to projevuje neméně, protože pouze pokud sázíme rostliny proporčně úměrně vůči jejich cílové velikosti a sociabilitě, můžeme pracovat s řádným sponem. U soliter a trsnatých peren střední výplně vede přehušťování jednoznačně ke zkracování životnosti kompozice a předčasné stagnaci. Rozsah sponů uváděný v různých zdrojích tak velice často jako maximální číslo vnímá právě onu přehušťovanou variantu. Neplatí u pokryvů na přísušku, svazích a ve stresových podmínkách, kde je posílení nutné. Minimální číslo je velmi dobré pro situaci, kdy máme adekvátní velikost rostlin k taxonu, dobře připravený záhon a zajištěnou jeho ochranu a péči.

POUŽITÉ ZDROJE

RHS Plantfinder

Foerster-Stauden Kompendium

Die Stauden DVD, Ulmer

Machala F., Müllerová M., Opatrná M., Naše trvalky

Grenfell, D.: Bohyšky

Horvath, B.: Sedums

Parer, R.: Hardy Geraniums

Picton, P. a H.: Asters

Větvička V., Skalická A., Zelený V., Botanický slovník

Fous. O.: Katalogy Hosta, Heuchera, Phlox, Hemerocallis

Zahradnické ceníky DS Průhonice, Bratří Schützové, Žehušice

Bakalářské a diplomové práce ZF Lednice

www.vasteplant.be

www.hostaparadise.com

www.helenium-phlox.de

www.hemskerkplants.com

www.zahradnictvikrulichovi.cz

www.gaissmayer.de

www.perennials.com

www.gardenia.net

www.ibotky.cz

